

방문접종 가이드라인 체크리스트

구분	방문접종 가이드라인	준수여부	
		예	아니오
접종 대상	「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설에서 입원·입소하여 생활하는 거동불편자로 독립적으로 의료기관 왕래가 불가능한 자 * 거동이 가능한 종사자 등은 의료기관에서 접종하여야 함(의료법) * 국가예방접종 대상자만 가능하며, 지자체예방접종 사업 대상자는 불가		
접종 인력	예진 및 접종, 접종 후 이상반응 대응을 위해 의사, 간호사를 포함하여 최소 2인 이상 방문 * 방문하는 시설 등에 간호사가 있는 경우 대체 가능하나, 간호사의 예방접종 등의 의료행위는 관련 법령(의료법, 노인장기요양보험법 등)에 따라 제한할 수 있음		
예방접종 전 유의사항	- 예방접종에 대한 정보를 확인 후, 건강상태를 고려하여 접종 여부를 결정할 수 있도록 안내 - '예방접종 예진표'를 작성하도록 하고, 예진 시 접종 전후 주의사항에 대해 설명		
접종 시 유의사항	<백신 콜드체인 유지> 「백신 보관 및 관리 가이드라인」 참고하여 2~8℃ 유지 - 온도계가 부착된 아이스박스 등 이동 중 백신 온도 관리 철저		
	<대상 및 백신 확인> 방문 의사는 접종 시행 전 예진 및 접종 동의 여부 확인을 철저히 하고, 접종할 백신 종류, 유효기한 등을 확인 후 시행 접종 후 20~30분 머무르며 접종자의 이상반응 등을 관찰		
	<응급상황 대비> 아나필락시스 대응을 위한 사전 준비 약품 및 장비 구비* 후 실시 - 사전 준비 약품 : 에피네프린 등 - 사전 준비 장비 : 청진기, 혈압계, 산소포화농도 측정기, 산소마스크, 산소발생기 및 산소공급장치, 정맥주사세트, 기도확보장치 등 * 단, 구급차를 대동하는 경우 구급차에 구비된 약품 및 장비로 대체 가능		
	<응급상황 발생 대응> 관내 이송 가능한 의료기관 현황을 파악하고 전화번호, 위치 등을 확인하여 즉시 이동 가능하도록 준비 - 접종 후 응급상황 발생 시 방문 의사는 환자 상태 평가 및 응급처치 지휘, 간호사는 응급처치 보조, 응급구조사 또는 행정요원은 이송 - 이외 아나필락시스 대응 관련 내용은 「아나필락시스 대응 매뉴얼」 참고		
접종 후 유의사항	- 접종 후 20~30분 동안 접종기관에 머무르며 이상반응 발생 관찰 - 예방접종통합관리시스템에 해당 접종기록을 등록		

방문 예방접종을 시행하는 의료기관으로서 위 가이드라인을 준수하여 접종할 것을 서약합니다.

년 월 일

방문접종 시설명			
시행 의료기관명		대표자명	(사인 또는 인)