

# 호남권 감염병 감시 주간소식지

2026년 14주차(2026.3.29.-4.4.)


※ 자료원: 질병관리청 감염병포털, 방역통합정보시스템, 잠정통계

## ▶ 14주 주요 감염병 ◀


### □ 전수감시 주요 감염병

\* 감염병 발생 규모와 양상을 고려하여 선정

- 홍역 1명 발생(호남권#1번, 전국#5번)하였으며, 전년(12명) 대비 91.7%(11명) 감소
- 수두 80명 발생으로 전년 대비 10.9% 증가 및 전국 대비 인구10만명당 발생률 1.3배 높음




<홍역 발생 현황>




<수두 발생 현황>

### □ 표본감시 주요 감염병

- 인플루엔자 감시(의원급 외래환자 기준)
  - 의사환자(IU) 분율 의원급 외래 환자 1,000명당 **호남 19.7명**, **전국 14.5명** 전주 대비 모두 감소
  - 의사환자분율 지속 감소 추세이나 **유행기준 대비 높은 발생**, 세부아형으로는 주로 **B형 바이러스**




<의원급 의뢰기관 주별 인플루엔자 의사환자 분율>



<의원급 의뢰기관 주별 인플루엔자 바이러스 아형 검출 현황(전국)>

- 전국 급성호흡기감염증 감시(병원급 입원환자 기준)

- (바이러스) 리노바이러스(26.0%), 사람메타뉴모바이러스(18.1%), 호흡기세포융합바이러스(17.8%) 발생
- (세균) 마이코플라스마 폐렴균(84.6%), 클라미디아 폐렴균(15.4%) 발생



<병원급 의뢰기관 바이러스성, 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 현황(전국)>

# 1 호남권 전수감시 감염병 발생 현황(2026년 14주차)

감염병	주간(2026.3.29.~2026.4.4.)											연간 누계(2025.12.28.~2026.4.4.)																		
	전국		호남권			광주		전북		전남		제주		전국		호남권			광주			전북			전남			제주		
	14주	14주	13주	14주	13주	14주	13주	14주	13주	14주	13주	14주	13주	'26	'26	'25	증감 (%)	'26	'25	증감 (%)	'26	'25	증감 (%)	'26	'25	증감 (%)	'26	'25	증감 (%)	
결핵	286	47	39	8	11	13	12	24	11	2	5	3,883	515	473	8.9	88	63	39.7	166	149	11.4	219	215	1.9	42	46	△8.7			
수두	624	80	56	32	18	22	19	11	10	15	9	6,973	970	875	10.9	293	186	57.5	281	227	23.8	198	334	△407	198	128	54.7			
홍역	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	12	△91.7	0	4	△100	1	0	순증	0	6	△100	0	2	△100			
장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
세균성 이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	2	△100	0	0	-			
장출혈성 대장균감염증	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	53	10	5	100.0	5	3	66.7	1	0	순증	1	2	△500	3	0	순증			
A형간염	28	3	6	0	0	3	5	0	1	0	0	405	61	64	△4.7	3	10	△700	42	29	44.8	10	15	△333	6	10	△400			
백일해	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	16	490	△96.7	3	106	△972	2	122	△984	10	178	△944	1	84	△988			
유형성이하선염	91	14	12	3	4	4	3	6	3	1	2	1,105	126	170	△25.9	36	51	△294	37	35	5.7	32	59	△458	21	25	△160			
풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
수막구균	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	△100.0	0	1	△100	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
b형헤모필루스 인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
폐렴구균감염증	13	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	121	9	16	△43.8	2	2	0.0	1	3	△667	3	8	△625	3	3	0.0			
성홍열	221	22	23	9	7	7	2	4	14	2	0	3,391	373	189	97.4	188	70	168.6	50	30	66.7	103	60	71.7	32	29	10.3			
VRSA†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
CRE†	907	83	96	23	23	37	40	18	26	5	7	13,779	1,297	1,084	19.6	328	307	6.8	538	409	31.5	343	284	20.8	88	84	4.8			
E형간염	10	1	5	1	0	0	3	0	2	0	0	164	21	37	△43.2	5	12	△583	5	14	△643	11	10	10.0	0	1	△100			
파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-			
B형간염	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	7	11	△36.4	2	2	0.0	2	2	0.0	3	6	△500	0	1	△100			
일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
C형간염	73	6	10	2	2	0	4	3	4	1	0	1,292	166	236	△29.7	43	42	2.4	36	63	△429	74	118	△373	13	13	0.0			
말라리아	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	△100.0	0	0	-	0	1	△100	0	1	△100	0	0	-			
레지오넬라증	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	205	14	9	55.6	0	2	△100	4	1	300.0	6	2	200.0	4	4	0.0			
비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
쯔쯔가무시증	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	32	10	22	△54.5	0	0	0.0	6	4	50.0	2	14	△857	2	4	△500			
렘트스피라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	△75.0	0	2	△100	1	0	순증	0	2	△100	0	0	-			
브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100	0	0	-			
신증후군출혈열	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	22	5	15	△66.7	1	2	△500	1	5	△800	3	7	△571	0	1	△100			
CJD,변종CJD†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100	0	0	-			
댕기열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	3	△66.7	0	0	-	0	0	-	0	3	△100	1	0	순증			
큐열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
라임병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
치쿤구니야열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
SFTS†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
지카바이러스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
매독	40	1	3	0	1	1	0	0	2	0	0	535	33	52	△36.5	6	14	△57.1	11	20	△450	11	13	△154	5	5	0.0			
엡폭스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			

\* : 2급감염병 (2급), 3급감염병 (3급), 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음  
 \*\* 미포함 감염병: 제1급감염병, 호남권역 미신고 감염병(콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염, 유비저 등), 호남권센터 비관리 감염병(후천성면역결핍증, 한센병) 제외  
 † VRSA: 반코마이신내성황색포도알균 감염증, CRE: 카바페넴내성장내세균속 감염증, CJD: 크로이츠펠트-야콥병, SFTS: 중증열성혈소판감소증후군

## 2 호남권 주요 감염병 발생 현황(2026년 14주차)

※ 주요 감염병: 결핵, 수두, 유행성이하선염, 성홍열, CRE, SFTS, 쯤쯤가무시증, B형간염, C형간염

### □ 주간 발생 추이

○ (전주 대비 증가) **홍역 ▲순증%<sup>①</sup>, 수두 ▲42.9%<sup>②</sup> 최근 4주 증감 반복**

① (10주)0명 → (11주)0명 → (12주)0명 → (13주)0명 → (14주)1명

② (10주)40명 → (11주)56명 → (12주)66명 → (13주)56명 → (14주)80명

○ (전년 동기간 대비 증가) **성홍열 ▲184명(97.4%)<sup>①</sup>, CRE ▲213명(19.6%)<sup>②</sup>**


① ('19년)295명 → ('22년)18명 → ('24년)41명 → ('25년)189명 → ('26년)373명

② ('19년)275명 → ('22년)498명 → ('24년)998명 → ('25년)1,084명 → ('26년)1,297명

### □ 주간 발생 현황

○ (14주) 총 259명, CRE 83명, 수두 80명, 결핵 47명 순

○ (누적) 총 3,637명, CRE 1,297명, 수두 970명, 결핵 515명 순













- (발생률) 쯤쯤가무시증<sup>3.0배</sup>, 수두<sup>1.3배</sup>, 결핵·C형간염<sup>1.2배</sup> 전국대비 인구 10만 명당 발생률 높음

< 전국·호남권 주요감염병 인구 10만명당 누적 발생률(1-14주) >

감염병	전국	호남권	광주	전북	전남	제주	
2급	결핵	7.59	9.22	6.28	9.59	12.28	6.29
	수두	13.63	17.37	20.93	16.23	11.10	29.66
	유행성이하선염	2.16	2.26	2.57	2.14	1.79	3.15
	성홍열	6.63	6.68	13.43	2.89	5.77	4.79
3급	CRE	26.93	23.23	23.42	31.07	19.23	13.18
	SFTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	쯤쯤가무시증	0.06	0.18	0.00	0.35	0.11	0.30
	B형간염	0.11	0.13	0.14	0.12	0.17	0.00
	C형간염	2.53	2.97	3.07	2.08	4.15	1.95

# □ 주요 감염병 발생 추이



### 3 표본감시 주요 감염병 발생 현황(2026년 14주차)


※ 호남권 표본감시는 참여 기관 수가 적어 통계적 대표성이 확보되지 않아 참고용으로 활용

□ **인플루엔자 환자감시** ※ 표본감시기관: (의원급) 전국 294개, 호남 33개, (병원급 이상) 전국 222개, 호남 31개

○ **(의원급 의사환자) 의사환자분율(ILI) 1,000명당 호남 19.7명, 전국 14.5명**

- 연령별로는 7~12세(호남 60.9명/전국 40.5명), 13~18세(호남 47.1명/전국 29.8명) 순으로 발생


전국 의원급 연령별, 주별 인플루엔자 의사환자분율




○ **(병원급 입원환자) 입원환자 호남 15명(12.0%), 전국 125명으로 전주 대비 모두 증가하였으며, '26년 누적 총 호남 492명, 전국 3,996명**

- 연령별로는 65세이상(호남 6명/전국 46명), 1-6세(호남 3명/전국 17명)으로 발생

병원급 인플루엔자 입원환자 수




전국 병원급 인플루엔자 입원환자 연도별, 연령별 현황




□ 급성호흡기감염증 환자감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 222개, 호남 31개

- (호흡기세포융합바이러스) 입원환자 호남 30명(10.6%), 전국 283명으로 전주 대비 모두 감소하였으며, '26년 누적 총 호남 641명, 전국 5,304명



- (리노바이러스) 입원환자 호남 44명(10.7%), 전국 412명으로 전주 대비 모두 증가하였으며, '26년 누적 총 호남 416명, 전국 3,410명



□ 장관감염증 환자감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 210개, 호남 30개

- (장관감염증 현황) 전국 신고환자 총 549명으로 전주 대비 감소하였으며, 세균 20.8%, 바이러스 79.2% 차지

< 최근 10주간 장관감염증 신고현황 >

(단위: 명(%))

구분	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주	13주	14주
전 체	1130	1031	977	758	730	580	530	596	594	549
세 균	143 (12.7)	109 (10.6)	121 (12.4)	102 (13.5)	104 (14.2)	116 (20.0)	110 (20.8)	138 (23.2)	142 (23.9)	114 (20.8)
바이러스	980 (86.7)	918 (89.0)	853 (87.3)	656 (86.5)	624 (85.5)	463 (79.8)	419 (79.1)	457 (76.7)	451 (75.9)	435 (79.2)
기타(원충)	7 (0.6)	4 (0.4)	3 (0.3)	0 (0.0)	2 (0.3)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	0 (0.0)

- (세균성) 캄필로박터균 47명, 살모넬라균 42명, 병원성대장균 17명 순

전국 세균성 장관감염증 신고현황



- (바이러스성) △노로바이러스 261명으로 정점(5주) 이후 연속하여 감소,  
△그룹 A형 로타바이러스 116명, 장내 아데노바이러스 39명 순


전국 바이러스성 장관감염증 신고현황



○ 주요 장관감염증

- (노로바이러스) 신고환자 호남 35명(13.4%), 전국 261명 전주 대비 모두 감소 하였으며, '26년 누적 총 호남 724명, 전국 6,439명

노로바이러스



## 붙임1 주의해야 할 감염병 - 인플루엔자

구분	내용
정의	□ 인플루엔자바이러스( <i>Influenzavirus A·B·C·D</i> ) 감염에 의한 급성호흡기질환
질병분류	□ KCD-10 J10.0~11.8
병원체	□ 인플루엔자바이러스
전파경로	□ 감염된 환자의 호흡기로부터 비말(droplet)로 전파
호발대상	□ 전 연령대 발생
잠복기	□ 50대 이상
감염력	□ 증상시작 1일전부터 발병 후 5~7일까지 □ 단, 소아나 면역저하자에서는 바이러스 배출기간이 10일 이상 길어지기도 함
주요증상	□ 고열(38~40°C), 마른기침, 인후통 등 호흡기 증상과 두통 근육통, 피로감, 쇠약감, 식욕부진 등 전신증상을 보임 □ 그 외에도 콧물, 코막힘, 안구통, 구토, 복통 등이 동반될 수 있음 □ 대부분 경증으로 자연 치유되지만 노인, 영유아, 만성질환자, 임신부 등은 합병증 발생 또는 기저질환의 악화로 입원치료를 받을 수 있고 일부는 사망에 이를 수 있음
합병증	□ 부비동염, 중이염 등 상부호흡기 감염증이 흔함 □ 모세기관지염, 기관지염, 폐렴 등 하부호흡기 감염증, 신경계 합병증(뇌염, 척수염, 길랑-바레 증후군), 횡단성 척수염, 심근염, 근육염(횡문근 용해증), 기흉 등이 발생 가능함
진단을 위한 검사기준	□ 검체(구인두도말, 비인두도말, 비인두흡인물, 비강흡인물, 기관지폐포세척액, 가래)에서 특이 유전자 검출
치료	□ 대증요법 □ 항바이러스제 치료
사망	□ 매년 약 290,000~650,000명의 인플루엔자 관련 호흡기 사망 발생(WHO) <sup>1)</sup>
예방	□ 예방접종 □ 일반적 예방 - 올바른 손씻기 · 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 - 기침 예절 · 호흡기 증상이 있을 때는 마스크 착용 · 기침이나 재채기할 때는 휴지나 옷소매 위로 입과 코를 가리고 하기 · 기침 후에는 반드시 올바른 손씻기, 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기 - 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 등을 만지지 않기 - 호흡기 증상자와 접촉 피하기 - 주위 표면과 물체 청소와 소독하기

1) WHO Influenza Factsheet, [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(seasonal\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal))

## 붙임2 주의해야 할 감염병 - 리노바이러스

구 분	내 용
정 의	□ 사람 리노바이러스(Human Rhinovirus) 감염에 의한 급성호흡기감염증
질 병 분 류	□ 법정감염병(제4급) □ 질병코드 : J02.8 & B97.88, J03.80 & B97.88, J03.81 & B97.88, J12.88 & B97.88, J20.6, J21.88 & B97.88
병원체	□ 피코르나바이러스과( <i>Picornaviridae</i> ) 장바이러스속( <i>enterovirus</i> )에 속하는 리노바이러스(Rhinovirus)
전파경로	□ 감염된 사람의 분비물과 직접 접촉 또는 비말 전파
잠복기	□ 1~3일
신고범위	□ 환자 : 리노바이러스 감염증에 부합되는 임상증상을 나타내면서 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병병원체 감염이 확인된 사람
진단을 위한 검사기준	□ 검체(구인두도말, 비인두도말, 비강흡인물, 비인두흡인물, 기관지폐포세척액, 가래 등)에서 특이 유전자검출
증상	□ 다른 호흡기바이러스에 비해 발열은 적은 편이며 기침, 콧물, 코막힘이 흔함. 인후통, 가래, 두통, 근육통, 식욕 없음 등 □ 감기, 중이염, 부비동염 등 상기도 감염을 잘 일으키나, 세기관지염, 폐렴 등 하기도 감염도 발생가능
치료	□ 대증 치료 : 해열제 등 대증 치료 □ 예방백신이나 특이적인 항바이러스제 없음
점염기간	□ 증상이 있는 기간 동안 전염력 있음 □ 증상 시작 24시간 전부터 증상 호전 후 3주까지 바이러스 배출 가능
치명률	□ 사망은 드물
관리	<환자관리> □ 표준주의 및 비말주의 준수, 다량의 분비물이 있거나 영유아와 같이 밀접하게 접촉하는 경우는 촉주의까지 준수 □ 증상이 있는 동안 가급적 집에서 휴식을 취하고 다른 사람과 접촉을 피하도록 권고  <접촉자 관리> □ 감염증상 발생 여부 관찰 : 마지막 노출 후 3일간 관찰
예방	□ 올바른 손씻기 - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 - 외출 후, 배변 후, 식사 전·후, 기저귀 교체 전·후, 코를 풀거나 기침, 재채기 후 등 실시 □ 기침 예절 준수 - 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기 - 호흡기 증상이 있는 경우 마스크 착용 □ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

참고

홍역 예방수칙 카드뉴스

2023.11.1. 질병관리청

### 홍역의 정의와 증상

기침 또는 재채기 등 비말과 공기를 통해 전파되는 감염병으로 전염성이 매우 높은 것이 특징입니다.

\* 홍역에 대한 면역이 불충분한 사람이 환자와 접촉 시, 90% 이상 감염

#### 홍역 주요 증상 (잠복기 7~21일)

전구기 → 발진기 → 회복기



전염력이 강한 시기로 발열, 기침, 콧물, 결막염, 구강 내 반점 등 발생

목 뒤, 귀 아래, 몸통, 팔다리, 손·발바닥에 홍반성 발진 발생

발진이 사라지면서 색소 침착

\* 기관지염, 크룹 등 호흡기 질환, 설사, 급성뇌염 등의 합병증 발생 가능

2/7

2023.11.1. 질병관리청

### 홍역 주요 발생 국가

올해 국내에서 5명이 해외유입을 통해 감염되었고, 해외여행 증가로 국민들이 감염될 가능성이 더욱 높아지고 있습니다.

#### 홍역 환자 발생 지역 분포

중동·동남아·아프리카를 중심으로 산발적 발생 및 유행이 지속되고 있는 상황



- 0명 (52개국, 27%)
- 1-9명 (37개국, 19%)
- 10-99명 (28개국, 15%)
- 100-999명 (28개국, 13%)
- ≥ 1,000명 (12개국, 6%)
- 자료없음
- 확인국가

\* 2022년 전 세계 홍역 발생 건수 : 약 17만 건(WHO 기준)

3/7

2023.11.1. 질병관리청

### 해외여행 시, 홍역 예방수칙

#### 여행 전

- 홍역 예방백신(MMR) 2회 모두 접종했는지 확인
- 2회 모두 접종하지 않았거나 접종 여부가 불확실한 경우, 출국 4~6주 전, 의료기관 방문하여 4주 간격으로 2회 접종 받기

#### 여행 중

- 사람이 많은 곳에서는 마스크 착용, 손 씻기, 기침예절 등 개인 위생수칙 준수하기

#### 입국 시

- 입국 시 발열 또는 발진 등이 있는 경우, 검역관에게 알리기

4/7


2023.11.1. 질병관리청

### 입국 후 발열, 발진 등 의심증상 발생 시

마스크 착용 및 타인과의 접촉 최소화하여 의료기관 방문 (대중교통 이용 자제)

의료진에게 '해외여행력' 알리기

저 000 국가에 다녀왔어요!



5/7

2023.11.1. 질병관리청

### 홍역 예방접종 바로 알기

#### 연령별 홍역 예방접종 기준

연령	접종 방법
생후 0-5개월	접종 대상 아님
생후 6-11개월 (가속접종*)	해외여행 시 1회 접종 * 불가피하게 표준 접종 일정을 지키지 못할 때, 신속하게 면역 획득해야 하는 경우 적용
생후 12-15개월 (적기접종)	1차 접종
4-6세 (적기접종)	2차 접종
청소년 및 성인*	※ 면역의 증거가 없는 경우 최소 4주 이상의 간격으로 2회(1회라도 1회) 접종

\* 1968년 1월 1일 이전에 출생한 경우, 홍역에 대한 자연면역이 있는 것으로 판단하여 접종 불필요

#### ※ 홍역 면역의 증거가 없는 경우

과거 예방접종 기록이 없으면서 홍역에 걸린 적이 없거나 홍역 완치가 확인되지 않는 1968년 1월 1일 이후 출생자

6/7

2023.11.1. 질병관리청

### 해외여행 전 홍역 예방수칙 체크하고 즐거운 여행 되세요!



7/7