

 <b>질병관리청</b>	<b>보 도 참 고 자 료</b>				
	2022. 4. 29. / (총 44매)				
배 포 일					
중앙방역대책본부 위기소통팀	팀 장	고 재 영	전 화	043-719-9381	
	담 당 자	김 남 혁		043-719-9344	
중앙사고수습본부 사회소통팀	팀 장	민 차 영	전 화	044-202-1711	
	담 당 자	이 영 지		044-202-1714	

## 코로나19 국내 발생 및 예방접종 현황 (4월 29일)

### 1. 코로나19 국내 발생 현황

- 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 4월 29일 0시 기준으로 재원중 위중증 환자는 526명, 사망자는 136명으로 누적 사망자는 22,724명(치명률 0.13%)이라고 밝혔다.

구분	4.23.	4.24.	4.25.	4.26.	4.27.	4.28.	4.29.
사망자*	151	109	110	82	141	122	136
재원중 위중증	738	726	668	613	546	552	526
입원	771	656	357	650	647	606	481

\* 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음

- 국내 발생 신규 확진자는 50,538명, 해외유입 사례는 30명이 확인되어 신규 확진자는 총 50,568명이며, 총 누적 확진자 수는 17,194,616명(해외유입 31,928명)이다.

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
국내	50,538	7,724	2,254	2,507	2,246	1,898	1,730	1,141	343	12,045	1,838	1,974	2,325	2,411	2,565	3,545	3,240	752	0
해외	30	2	0	0	8	2	3	0	0	1	2	0	0	1	0	7	0	0	4
합계	50,568	7,726	2,254	2,507	2,254	1,900	1,733	1,141	343	12,046	1,840	1,974	2,325	2,412	2,565	3,552	3,240	752	4

- 국내 발생 신규 확진자 중 60세 이상 고위험군은 11,600명(23.0%)이며, 18세 이하는 8,748명(17.3%)이다.

구분	4.23.	4.24.	4.25.	4.26.	4.27.	4.28.	4.29.
국내 확진자 수	75,403	64,671	34,330	80,335	76,747	57,443	50,538
60세 이상	18,836	16,022	6,610	16,681	18,258	12,742	11,600
%	25.0	24.8	19.3	20.8	23.8	22.2	23.0
18세 이하	13,994	11,664	7,721	16,001	13,571	10,011	8,748
%	18.6	18.0	22.5	19.9	17.7	17.4	17.3

- 4월 29일 0시 기준 국내 주요 발생 현황은 다음과 같다.

※ 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표 자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있으며, 향후 역학조사에 따라 분류 결과 변동 가능

- 4월 29일 0시 기준 국내 발생 신규 확진자는 50,538명이며(최근 1주간 일 평균 62,781.0명), 수도권에서 22,015명(43.6%) 비수도권에서는 28,523명(56.4%)이 발생하였다.

(주간: 4.23.~4.29., 단위: 명)

구분	전국	수도권	충청권	호남권	경북권	경남권	강원권	제주권
		(서울, 인천, 경기)	(대전, 세종, 충남, 충북)	(광주, 전남, 전북)	(대구, 경북)	(부산, 울산, 경남)	(강원)	(제주)
4.29.(0시 기준)	50,538	22,015	6,372	6,874	6,052	6,635	1,838	752
주간 일 평균	62,781.0	28,177.3	7,974.4	8,202.3	7,232.0	7,955.7	2,335.0	904.3
주간 총 확진자 수	439,467	197,241	55,821	57,416	50,624	55,690	16,345	6,330
주간 발생률*	121.6	108.3	143.9	162.1	144.3	102.2	151.8	133.6

\* 인구 10만 명당 발생률

## 2. 코로나19 치료병상 및 재택치료 현황

- 코로나19 병상 보유량은 전체 33,201병상이다. 병상 가동률은 위중증병상 27.6%, 준-중증병상 35.3% 중등증병상 18.8%이다. 생활치료센터 가동률은 10.4%이다. (4.29. 0시 기준)

구분 (단위: 개)	위중증				준중증				중등증				경증			
	중환자 전담치료병상				준-중환자 병상				감염병 전담병원				생활치료센터			
	보유	사용	%	가용	보유	사용	%	가용	보유	사용	%	가용	보유	사용	%	가용
전국	2,781	767	27.6	2,014	3,555	1,254	35.3	2,301	15,956	2,994	18.8	12,962	10,909	1,132	10.4	9,777
수도권	1,947	514	26.4	1,433	2,520	770	30.6	1,750	7,211	1,071	14.9	6,140	7,486	605	8.1	6,881
비수도권	834	253	30.3	581	1,035	484	46.8	551	8,745	1,923	22	6,822	3,423	527	15.4	2,896

- 입원 대기환자는 2021년 12월 29일 0명으로 해소된 이후 지속적으로 0명이다.
- 4월 29일 0시 기준 현재 재택치료자는 392,706명이다. 어제 신규 재택치료자는 51,844명(수도권 23,548명, 비수도권 28,296명)이다.

재택치료 현황		신규재택치료자(4.28.)
전체	(집중관리군)	
392,706명	(34,724명)	51,844명

- 재택치료자 집중관리군의 건강관리(1일 2회)를 위한 관리의료기관은 전국 1,107개소이며, (4.29. 0시 기준)
- 재택치료자 일반관리군 전화상담·처방이 가능한 동네 의료기관은 전국 9,703개소\*이다. (4.28. 17시 기준) \* 운영개시 예정인 기관 포함

- 이외 24시간 운영되는 재택치료 의료상담센터도 전국 253개소 운영되고 있다. (4.28. 17시 기준)

관리의료기관	전화상담·처방 의료기관	의료상담센터
1,107개소	9,703개소	253개소

- 신속항원검사가 가능한 의료기관은 호흡기전담클리닉 477개소, 호흡기 진료 지정 의료기관 10,041개소로, 전국에 10,518개소가 있다. (4.28. 17시 기준)

총계	호흡기 전담클리닉	호흡기 진료 지정 의료기관
10,518개소	477개소	10,041개소

### 3. 코로나19 변이바이러스 분양 현황

□ 국립보건연구원은 국가병원체자원은행(NCCP)을 통해 유관부처 및 연구기관 등에 분양된 **코로나19 바이러스 변이주 분양 현황**(4. 27. 0시 기준)을 안내하였다.

○ 코로나19 바이러스 변이주는 현재까지(22. 4. 27.) 총 **110개** 기관에 **1,921건**이 분양되었다.

- 활용 목적별로는 ▲백신 및 치료제 연구용 **498건**, ▲진단기술 개발용 **1,397건**, ▲정도관리용 **5건**, ▲기타 융합연구 등 **21건**이 분양되었으며,

- 변이 유형별로는 ▲VOC는 **1,183\***건, ▲FMV는 **90\*\***건, ▲VOI **648\*\*\***건이 되었다.

\* VOC(1,183): 알파(187), 베타(184), 감마(135), 델타(446), 오미크론(231)

\*\* FMV(90): 기타(90)

\*\*\* VOI(648): 에타(86), 카파(123), 입실론(180), 아오타(90), 제타(94), 유(75)

○ 국립보건연구원은 향후 자원 다양성 확보를 위해 변이주에 대한 자원 수집을 민간부분으로 확대하여, 보건의료산업 발전에 기여하겠다고 밝혔다.

\* (분양문의) 국립보건연구원 병원체자원관리과, 043-913-4270, 병원체자원은행 누리집: <http://nccp.kdca.go.kr>

※ 국가병원체자원은행에서 분양하는 코로나19바이러스는 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 기탁자원임

### [국내 코로나19 바이러스 변이주 분양 현황(22. 4. 27. 0시 기준)]

자원		목적	백신·치료제연구	진단기술연구	기타 (정도관리 포함)	계
분양기관			21	86	3	110
분양수(주)			498	1397	26	1921
VOC주	알파형 (영국 GRY: B.1.1.7)		56	127	4	187
	베타형 (남아프리카공화국 GH: B.1.351)		53	127	4	184
	감마형 (미국/브라질 GR: P.1)		37	96	2	135
	델타형 (인도 G: 1.617.2)		62	109	2	173
	델타형 (인천 GK: B.1.617.2 K417N 포함)		9	64	0	73
	델타형 (서울 GK: AY.1)		11	69	2	82
	델타형 (경기 GK: AY.69)		11	49	0	60
	델타형 (경기 GK: AY.122)		11	47	0	58
	오미크론형 (경기 GRA: B.1)		46	132	1	179
	오미크론형 (경기 GRA: B.1.1)		7	11	1	19
	오미크론형 (경기 GRA: B.2)		11	21	1	33
VOI*	무형 (콜롬비아 GH: B.1.621)		15	59	1	75
	입실론형 (미국/캘리포니아 GH: B.1.427)		22	62	1	85
	입실론형 (미국/캘리포니아 GH: B.1.429)		27	67	1	95
	제타형 (브라질 GR: P.2)		28	63	3	94
	에타형 (영국/나이지리아 G: B.1.525)		22	63	1	86
	아오타형 (미국/뉴욕 GH: B.1.526)		21	68	1	90
	카파형 (인도 G: B.1.617.1)		35	87	1	123
FMV주	기타형 (경기 G: B.1.619)		7	41	0	48
	기타형 (서울 G: B.1.620)		7	35	0	42

\* WHO SARS-CoV-2 variants 분류변경으로 인하여 기존의 FMV(Formerly Monitored Variants)에서 VOI로 변경

(참고. Tracking of SARS-CoV-2 variants, WHO) (22. 4. 12.)

#### 4. 코로나19 치료제 투약 현황

□ 중앙방역대책본부는 **코로나19 치료제 투약현황**(4.28. 0시 기준)을 안내하였다.

○ 먼저, 코로나19 치료제인 '메클루리주(길리어드, 렘데시비르)'는 현재까지 **543개 병원 78,989명**의 환자에게 투여되었다.

※ 먹는 치료제 사용 및 재고 현황 붙임4 참고

#### 5. 코로나19 예방접종 현황

□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장: 정은경 청장)은 **4월 29일 0시 기준 1차접종자 1,068명, 2차접종자 1,345명, 3차접종자 9,436명, 4차접종자 198,844명으로, 누적 1차접종자수는 45,027,685명, 2차접종자수는 44,543,484명, 3차접종자수는 33,101,901명, 4차접종자수는 1,670,097명**이라고 밝혔다.

【코로나19 예방접종 현황】

(단위 : 명, %)

구분	전일 누계(A)	신규 접종(B) <sup>1)</sup>	누적 접종(A+B) <sup>1)</sup>	인구 <sup>2)</sup> 대비 접종률			
				전체	12세+	18세+	60세+
1차	45,026,617	1,068	45,027,685	87.7	95.6	97.3	96.4
2차	44,542,139	1,345	44,543,484	86.8	94.6	96.4	95.8
3차	33,092,465	9,436	33,101,901	64.5	70.3	74.2	89.4
4차	1,471,253	198,844	1,670,097				
(60세 이상) <sup>3)</sup>	1,370,219	196,719	1,566,938	3.3			11.4

1) 안센 백신의 경우 1회 접종으로 기초 접종이 완료되므로 안센 1차 접종은 '2차 접종' 합계에도 추가, 안센 2차의 경우 3차 합계에 추가  
 2) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)  
 3) 60세 이상 연령층 4차접종 시행에 따라 접종자 별도 표시

【백신별 접종현황】

(단위 : 명)

구분	1차접종		2차접종		3차 접종		4차 접종	
	신규	누적	신규	누적	신규	누적	신규	누적
계	1,068	45,027,685	1,345	44,543,484	9,436	33,101,901	198,844	1,670,097
PF	630	25,429,695	644	26,987,847	7,537	22,167,541	176,025	1,426,869
M	12	6,812,043	35	6,637,457	1,231	10,847,643	13,831	130,442
AZ	-	11,075,154	-	9,241,862	-	1,633	-	-
J <sup>1)</sup>	5	1,516,080			-	26,824	2	4
NVX	421	113,438	661	81,340	668	51,986	8,986	112,782
기타백신 <sup>2)</sup>	-	81,275	-	78,898	-	6,274	-	-

1) 안센백신은 1차 접종으로 기초 접종이 완료되어, 2차 접종으로 백신 사용되지 않음  
 2) 기타백신은 국외 허가백신(국내 미승인 백신(WHO 승인백신))의 접종력이 등록된 자(시노팜, 시노백 등)

□ **4월 29일 0시 기준 성별·연령별 접종 현황**은 다음과 같다.

【성별·연령별 접종 현황】

(단위 : 명, %)

구분	인구 <sup>1)</sup> (A)	접종자 현황 <sup>2)</sup>				접종률				
		1차(B)	2차(C)	3차(D)	4차(E)	1차 (B/A)	2차 (C/A)	3차 (D/A)	4차 (E/A)	
계	51,317,389	45,027,685	44,543,484	33,101,901	1,670,097	87.7	86.8	64.5	3.3	
성별	남성	25,575,878	22,538,999	22,307,780	16,463,577	801,437	88.1	87.2	64.4	3.1
	여성	25,741,511	22,488,686	22,235,704	16,638,324	868,660	87.4	86.4	64.6	3.4
연령	80세 이상	2,455,738	2,239,316	2,217,741	2,073,940	488,290	91.2	90.3	84.5	19.9
	70-79세	3,883,747	3,750,042	3,732,536	3,563,313	595,913	96.6	96.1	91.7	15.3
	60-69세	7,404,447	7,253,657	7,219,285	6,655,596	482,735	98.0	97.5	89.9	6.5
	50-59세	8,574,374	8,441,455	8,394,179	7,003,176	65,871	98.4	97.9	81.7	
	40-49세	8,035,809	7,733,257	7,663,983	5,395,163	23,587	96.2	95.4	67.1	
	30-39세	6,591,585	6,392,259	6,297,451	3,831,100	8,699	97.0	95.5	58.1	
	20-29세	6,404,726	6,371,932	6,304,265	3,772,282	4,967	99.5	98.4	58.9	
	12-19세	3,732,656	2,808,748	2,712,964	807,331	35	75.2	72.7	21.6	
	(18-19세)	(963,728)	(916,021)	(907,239)	(584,630)	(35)	(95.0)	(94.1)	(60.7)	
	(12-17세)	(2,768,928)	(1,892,727)	(1,805,725)	(222,701)	(-)	(68.4)	(65.2)	(8.0)	
5-11세 <sup>3)</sup>	3,067,614	37,019	1,080			1.2	0.0			
4세 이하	1,166,693									

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)  
 2) 안센 백신의 경우 1회 접종으로 기초 접종이 완료되므로 안센 1차 접종은 '2차 접종' 합계에도 추가, 안센 2차의 경우 3차 합계에 추가  
 3) 2011년~2017년 출생자의 접종 현황으로 국외 접종력 등 포함  
 ※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임


## 6. 인플루엔자 예방수칙 준수 당부

□ 질병관리청은 지난주 인플루엔자 발생 동향을 공유하고, 예방수칙 준수를 당부하였다.

○ 2022년 17주(4.17.~4.23.)의 인플루엔자의사환자(ILI) 분율은 외래환자 1,000명당 2.8명(전년 동기간 2.0명)으로 16주(3.1명) 대비 감소하였으며, 유행기준(5.8명) 이하를 유지하고 있다.

< 최근 2절기 인플루엔자 의사환자 분율 현황 >

구분	8주	9주	10주	11주	12주	13주	14주	15주	16주	17주
2020-2021	2.0	1.2	1.9	2.2	2.0	2.2	2.5	2.3	2.3	2.0
2021-2022	3.7	3.9	3.6	3.8	4.8	4.5	3.9	3.2	3.1	2.8



- \* (자료원) 전국 인플루엔자 표본감시 기관(의원급 의료기관 199개소) 주간 단위 보고자료
- \* 인플루엔자 의사환자 : 38.0°C 이상의 갑작스런 발열과 더불어 기침 또는 인후통이 있는 자
- \* 2021-2022절기 유행주의보 발령 기준 : 5.8명 / 외래환자 1,000명

○ 2022년 17주(4.17.~4.23.)의 의원급 의료기관(63개소) 대상 인플루엔자 및 호흡기바이러스감염증 병원체감시\*(KINRESS) 및 병원급 의료기관(219개소) 대상 급성호흡기감염증 표본감시 결과, 인플루엔자바이러스는 검출되지 않았다.

\* 의원급 의료기관 호흡기바이러스 감시(17주) : 의뢰 검체 79건 중 리노바이러스 26건(32.9%), 사람코로나바이러스 4건(5.1%), 호흡기세포융합바이러스 3건(3.8%), 아데노바이러스 2건(2.5%), 사람보카바이러스 2건(2.5%), 인플루엔자·파라인플루엔자바이러스 각 0건

※ 검사전문의료기관(5개소)에서 수행한 호흡기질환 환자 대상 진단검사 결과를 취합하여 분석한 인플루엔자바이러스 검출률은 11주(3.6~3.12.) 0%, 12주(3.13~3.19.) 0%, 13주(3.20~3.26.) 0%, 14주(3.27~4.2.) 0%, 15주(4.3~4.9.) 0%, 16주(4.10~4.16.) 0.08%

□ 질병관리청은 인플루엔자 등 호흡기감염병에 감염될 위험을 낮추기 위해 마스크 착용, 기침예절 지키기 등 개인위생수칙을 지속적으로 실천하여 주실 것을 당부하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

\* 확진자 급증에 따라 당일 일부 중복 및 오신고 건들이 있어 익일 확인시 정정하고 있습니다. 확진자 신고 및 집계 업무 부담 증가로 오신고 등의 구체적 내역 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.

코로나19 일일 확진자 통계(국내/해외발생/사망/성별/연령별/시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려 받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황도 확인할 수 있습니다(매일 18시 이전 업데이트).

\* (일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ '(누적)확진' ▶ 다운로드(화살표선택) ▶ 엑셀파일 시트별 확인가능

\*\* (누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 대응 권역별 병상 현황(생활치료센터 포함)
  3. 코로나19 예방접종 현황
  4. 먹는 치료제 사용 및 재고 현황 (4.28. 18시 30분 기준)
  5. 해외 주요 국가 방역 현황 통계
  6. 확진자 및 동거인 안내문 ①
  7. 확진자 및 동거인 안내문 ②
  8. 재택치료 안내문 [집중관리군]
  9. 재택치료 안내문 [일반관리군]
  10. 재택치료자 동거인 안내문
  11. 유전자검사(PCR) 우선순위 대상 안내문
  12. 개인방역 6대 중요 수칙
  13. 면역저하자 코로나19 예방접종 안내문
  14. 만 5-11세 소아 코로나19 예방접종 안내문
  15. 청소년 코로나19 예방접종 안내문(청소년용)
  16. 12-17세 청소년 3차접종 안내문
  17. 청소년 심근염·심낭염 진료 안내문(의료인용)
  18. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

**붙임 1** **코로나19 국내 발생 현황**

**1** **성별·연령별 확진자 현황(4.29. 0시 기준, 누적 17,194,616명)**

**< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >**

구 분	금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*	
계	50,568 (100.0)	17,194,616 (100.0)	33,298	
성별	남성	23,235 (45.9)	8,089,528 (47.0)	31,420
	여성	27,333 (54.1)	9,105,088 (53.0)	35,165
연령	80세 이상	1,967 (3.9)	498,947 (2.9)	23,669
	70-79	3,438 (6.8)	819,309 (4.8)	22,054
	60-69	6,199 (12.3)	1,740,308 (10.1)	24,290
	50-59	7,158 (14.2)	2,113,619 (12.3)	24,477
	40-49	7,495 (14.8)	2,662,568 (15.5)	32,602
	30-39	7,359 (14.6)	2,533,055 (14.7)	37,675
	20-29	7,676 (15.2)	2,470,938 (14.4)	37,124
	10-19	4,751 (9.4)	2,259,176 (13.1)	47,972
0-9	4,525 (8.9)	2,096,696 (12.2)	55,758	

\* 성별·연령별 '20.1월 이후 누적 확진자수/성별·연령별 인구('21.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)  
 ※ 역학조사 결과 변동 가능, 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr)에서 일자별 전체 확진자 현황 다운로드 가능

**2** **지역별 확진자 현황 (4.29. 0시 기준, 50,568명)**

**< 지역별 확진자 현황('20.1.3. 이후 누계) >**

지역	금일신규		확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률
	국내발생	해외유입		
서울	7,724	2	3,475,126 (20.2)	36,544
부산	2,254	0	1,049,589 (6.1)	31,327
대구	2,507	0	706,817 (4.1)	29,631
인천	2,246	8	1,030,503 (6.0)	34,952
광주	1,898	2	501,190 (2.9)	34,766
대전	1,730	3	479,245 (2.8)	33,000
울산	1,141	0	353,783 (2.1)	31,543
세종	343	0	130,293 (0.8)	35,035
경기	12,045	1	4,710,003 (27.4)	34,721
강원	1,838	2	478,821 (2.8)	31,123
충북	1,974	0	520,303 (3.0)	32,571
충남	2,325	0	671,565 (3.9)	31,689
전북	2,411	1	559,483 (3.3)	31,311
전남	2,565	0	554,221 (3.2)	30,239
경북	3,545	7	711,315 (4.1)	27,081
경남	3,240	0	1,029,726 (6.0)	31,070
제주	752	0	221,628 (1.3)	32,748
검역	0	4	11,005 (0.1)	-
총합계	50,538	30	17,194,616 (100.0)	33,298

\* 지역별 '20.1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구 ('21.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)  
 \*\* 신고 기관 주소 환자 수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

### 3] 사망자 및 위중증 현황 (4.29. 0시 기준)

구 분	신규 사망	(%)	사망누계	(%)	치명률(%)	위중증 구성비(%)
계	136	(100.00)	22,724	(100.00)	0.13	526 (100.00)
성별	남성	70 (51.47)	11,031 (48.54)	0.14	304 (57.79)	
	여성	66 (48.53)	11,693 (51.46)	0.13	222 (42.21)	
연령	80세 이상	87 (63.97)	13,391 (58.93)	2.68	225 (42.78)	
	70-79	32 (23.53)	5,256 (23.13)	0.64	134 (25.48)	
	60-69	13 (9.56)	2,692 (11.85)	0.15	98 (18.63)	
	50-59	3 (2.21)	923 (4.06)	0.04	40 (7.60)	
	40-49	0 (0.00)	285 (1.25)	0.01	14 (2.66)	
	30-39	1 (0.74)	99 (0.44)	0.00	7 (1.33)	
	20-29	0 (0.00)	52 (0.23)	0.00	4 (0.76)	
	10-19	0 (0.00)	8 (0.04)	0.00	2 (0.38)	
	0-9	0 (0.00)	18 (0.08)	0.00	2 (0.38)	

\* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100  
 \* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법 인공호흡기 ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자  
 \* 사망자 집계는 사망 신고 집계일 기준으로 실제 사망일과 차이가 있을 수 있음  
 ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

### 4] 해외유입 확진자 현황 (4.29. 0시 기준, 30명)

구분	합계	(추정)유입국가*							확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세아니아	미확인	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	30	0	18	7	4	0	1	0	4	26	12	18
누계	31,928	531 (1.7%)	15,847 (49.6%)	4,594 (14.4%)	8,971 (28.1%)	1,576 (4.9%)	409 (1.3%)	0 (0.0%)	11,005 (34.5%)	20,923 (65.5%)	17,537 (54.9%)	14,391 (45.1%)

### 5] 최근 1주간 검사 및 확진자 현황 (4.23~4.29.)

(단위 : 건, 명, %)

구 분	4.23.	4.24.	4.25.	4.26.	4.27.	4.28.	4.29.	주간누계	총 누계
총 검사 건수 <sup>1)</sup>	177,802	91,750	78,546	267,286	174,620	117,873	집계중	907,877	170,034,620
선별진료소(통합) 검사 건수 <sup>2)</sup>	108,205	49,896	47,932	168,728	102,811	64,983	127,345	669,900	27,963,650
신규 확진자 수 <sup>3)</sup>	75,432	64,704	34,361	80,351	76,784	57,464	50,568	439,664	17,194,616

1) (총 검사 건수) 검사 기관(의료기관, 검사전문기관(수탁), 보건환경연구원)으로부터 보고된 건수를 보고일 기준으로 집계한 수치로서 보고기관의 상황에 따라 변동될 수 있는 잠정 통계임  
 \* 감염취약시설 선제검사, 해외입국자 검사, 의료기관·시설의 입원·입소 전 검사, 확진자 경과 관찰 중 검사 등  
 2) (선별진료소(통합) 검사 건수) 선별진료소(통합) 검사 건수를 시스템을 통해 집계한 수치  
 3) (신규 확진자 수) 코로나19 정보관리시스템에 신고된 PCR 양성자 수와 전문가용 신속항원검사(RAT) 양성자 수

### 붙임 2 | 코로나19 대응 권역별 병상 현황(생활치료센터 포함)

(4.29. 0시 기준, 단위: 개)

구 분	危重症			準-重症			中等症			무증상·輕症			
	중환자 전담치료병상			준-중환자 병상			감염병전담병원			생활치료센터			
권역	시도	보유	사용	가용	보유	사용	가용	보유	사용	가용	보유	사용	가용
전국		2,781	767	2,014	3,555	1,254	2,301	15,956	2,994	12,962	10,909	1,132	9,777
수도권	소계	1,947	514	1,433	2,520	770	1,750	7,211	1,071	6,140	7,486	605	6,881
	중수본										1,774	75	1,699
	서울	685	219	466	593	235	358	3,311	487	2,824	3,795	359	3,436
	경기	845	210	635	1,314	402	912	2,660	448	2,212	1,541	137	1,404
	인천	417	85	332	613	133	480	1,240	136	1,104	376	34	342
강원	소계	63	32	31	51	32	19	481	110	371	315	15	300
충청권	소계	173	55	118	203	124	79	2,044	377	1,667	618	54	564
	권역(중수본)										0	0	0
	대전	66	20	46	57	36	21	624	135	489	521	24	497
	세종	6	0	6	5	1	4	52	3	49	97	30	67
	충북	41	12	29	49	19	30	584	118	466	0	0	0
	충남	60	23	37	92	68	24	784	121	663	0	0	0
하남권	소계	211	61	150	225	123	102	2,184	533	1,651	380	108	272
	권역(중수본)										0	0	0
	광주	54	20	34	68	37	31	424	84	340	110	17	93
	전북	121	18	103	106	68	38	804	163	641	144	88	56
	전남	36	23	13	51	18	33	956	286	670	126	3	123
전남권	소계	168	57	111	197	108	89	1,910	453	1,457	322	126	196
	권역(중수본)										0	0	0
	대구	137	38	99	175	96	79	890	161	729	172	64	108
	경북	31	19	12	22	12	10	1,020	292	728	150	62	88
전북권	소계	197	48	149	332	89	243	1,829	386	1,443	1,231	203	1,028
	권역(중수본)										0	0	0
	부산	99	18	81	98	25	73	713	157	556	714	126	588
	울산	35	6	29	133	20	113	397	34	363	277	29	248
	경남	63	24	39	101	44	57	719	195	524	240	48	192
제주	소계	22	0	22	27	8	19	297	64	233	557	21	536

### 붙임 3 코로나19 예방접종 현황

#### 1 시도별 접종 현황

(단위: 명, %)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	
인구(A)	51,317,389	9,401,888	3,330,119	2,373,789	2,927,910	1,436,183	1,445,245	1,117,766	371,138	13,481,931	1,531,467	1,591,483	2,111,258	1,779,949	1,826,601	2,616,627	3,301,135	672,808	
신규(B)	1차	1,068	159	63	31	49	17	25	28	4	268	61	49	66	65	48	48	50	37
	2차	1,345	269	77	48	67	27	49	28	9	304	61	41	73	58	67	82	67	18
	3차	9,436	1,840	547	396	454	242	288	215	52	2,267	322	336	381	371	373	518	666	168
	4차	198,844	32,157	11,813	7,129	9,379	6,173	6,641	4,000	892	38,999	8,797	8,669	11,017	12,778	13,771	11,275	12,401	2,953
	누계(C)	1차(C)	45,027,685	8,330,802	2,876,995	2,017,525	2,564,229	1,261,259	1,244,737	967,606	297,239	11,801,591	1,347,114	1,425,671	1,894,673	1,590,514	1,650,474	2,239,459	2,878,945
2차(C)	44,543,484	8,244,064	2,845,419	1,998,112	2,536,886	1,247,581	1,231,160	957,247	292,977	11,673,511	1,334,316	1,411,339	1,874,494	1,574,952	1,638,086	2,263,453	2,943,654	582,542	
3차(C)	33,101,901	5,964,584	2,104,910	1,384,619	1,879,924	955,384	895,297	710,505	205,384	8,552,238	1,048,339	1,089,530	1,454,956	1,267,505	1,349,946	1,701,929	2,111,806	430,996	
4차(C)	1,670,097	266,484	111,038	54,143	75,557	57,091	47,601	26,882	8,752	361,826	65,231	69,513	85,628	106,301	121,931	88,198	104,565	19,356	
접종률(C/A)	1차(C/A)	87.7	88.6	86.4	85.0	87.6	87.8	86.1	86.6	80.1	87.5	88.0	89.6	89.7	89.4	90.4	87.5	87.2	87.6
	2차(C/A)	86.8	87.7	85.4	84.0	86.6	86.9	85.2	85.6	78.9	86.6	87.1	88.7	88.8	88.5	89.4	86.5	86.2	86.6
	3차(C/A)	64.5	63.4	63.2	58.3	64.2	66.5	61.9	63.6	55.3	63.4	68.5	68.9	71.2	73.6	65.0	64.0	64.1	
	4차(C/A)	3.3	2.8	3.3	2.3	2.6	4.0	3.3	2.4	2.4	2.7	4.3	4.4	4.1	6.0	6.7	3.4	3.2	2.9

\* 21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)

※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

#### 2 만 5~11세(소아용 백신 대상) 기초접종 사전예약 및 접종현황

(단위: 명, %)

구분	인구 <sup>1)</sup> (A)	예약자(B)	예약률(B/A)	접종자 <sup>2)</sup>		접종률	
				1차 접종(C)	2차 접종(D)	1차(C/A)	2차(D/A)
5-11세	3,147,942	57,972	1.8	47,534	1,107	1.5	0.0

1) '22. 4. 30일 기준 "만" 나이 5세~11세로 소아용 백신 접종 가능 대상 인구(생일이 지난 2017년생~생일이 지나지 않은 2010년생)

2) 국외 접종력 등 포함

#### 3 연령별 3차 접종 사전예약 및 접종현황

(단위: 명, %)

구분	인구 <sup>1)</sup> (A)	대상자 <sup>2)</sup> (B)	예약자(C)	예약률		접종자(D)	접종률	
				인구 대비(C/A)	대상자 대비(C/B)		인구 대비(D/A)	대상자 대비(D/B)
총계	47,083,082	44,058,809	33,115,227	70.3	75.2	33,101,901	70.3	75.1
60세 이상 계	13,743,932	13,110,760	12,321,556	89.7	94.0	12,292,849	89.4	93.8
80대 이상	2,455,738	2,203,076	2,082,712	84.8	94.5	2,073,940	84.5	94.1
70-79세	3,883,747	3,719,187	3,570,138	91.9	96.0	3,563,313	91.7	95.8
60-69세	7,404,447	7,188,497	6,668,706	90.1	92.8	6,655,596	89.9	92.6
18-59세 계	30,570,222	29,299,794	20,531,731	67.2	70.1	20,586,351	67.3	70.3
50-59세	8,574,374	8,350,305	7,032,333	82.0	84.2	7,003,176	81.7	83.9
40-49세	8,035,809	7,602,126	5,432,533	67.6	71.5	5,395,163	67.1	71.0
30-39세	6,591,585	6,208,833	3,860,903	58.6	62.2	3,831,100	58.1	61.7
20-29세	6,404,726	6,244,333	3,609,069	56.4	57.8	3,772,282	58.9	60.4
18-19세	963,728	894,197	596,893	61.9	66.8	584,630	60.7	65.4
12-17세 계	2,768,928	1,648,255	261,940	9.5	15.9	222,701	8.0	13.5

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)

2) '22. 4. 30일 기준 접종대상자(대상군별 접종간격은 상이)

※ 상기통계자료는 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

#### 4 60대 이상 연령층 4차 접종 사전예약 및 접종현황

(단위: 명, %)

구분	인구 <sup>1)</sup> (A)	대상자 <sup>2)</sup> (B)	예약자(C)	예약률		접종자(D)	접종률	
				인구 대비(C/A)	대상자 대비(C/B)		인구 대비(D/A)	대상자 대비(D/B)
60세 이상 계	13,743,932	10,746,900	3,032,807	22.1	28.2	1,566,938	11.4	14.6
80대 이상	2,455,738	1,959,011	861,502	35.1	44.0	488,290	19.9	24.9
70-79세	3,883,747	3,289,703	1,161,783	29.9	35.3	595,913	15.3	18.1
60-69세	7,404,447	5,498,186	1,009,522	13.6	18.4	492,735	6.5	8.8

1) '21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외)

2) '22. 4. 30일 기준 접종대상자(대상군별 접종간격은 상이)

※ 상기통계자료는 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

#### 4 고위험군 추가접종 현황(4차 접종)

(단위: 명)

구분	전일 누계	신규 접종	누적 접종
고위험군 (면역저하자 및 요양병원·시설, 정신건강증진시설)	428,769	15,436	444,205

※ 상기통계자료는 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

#### 5 국내 백신 잔여량

(단위: 만 회분)

화이자	화이자(소아용)	모더나	얀센	노바백스	총계	비고
909.2	19.9	346.2	198.6	167.1	1,641.0	

※ 상기통계자료는 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

### 붙임 4 먹는 치료제 사용 및 재고 현황 (4.28. 18시 30분 기준)

□ 먹는 치료제 전체 재고량: 577,567 명분(4.28. 18시 30분 기준)

※ 입력자의 수치 오입력 및 전일 18시 30분 이후 입력된 값 등은 당일 통계에 보정·반영하여 산출

□ 먹는 치료제 대상별 사용량 (1.14~4.28)

(단위: 명분)

치료제	사용량 합계		재택치료	생활치료센터	감염병전담병원	보건소	기타
팍스로비드	누적	232,861	193,057	1,755	34,356	2,011	1,682
라게브리오	누적	17,602	14,370	181	2,692	359	0

※ 입력자의 수치 오입력 및 전일 18시 30분 이후 입력된 값 등은 당일 통계에 보정·반영하여 산출

□ 먹는 치료제 지역별 사용량 (1.14~4.28)

(단위: 명분)

치료제 구분	구분	계	지역																	
			서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	중앙
팍스로비드	누적	232,861	41,321	19,984	12,954	12,759	5,551	6,522	3,023	850	47,604	9,487	8,814	9,518	10,681	13,460	10,874	15,535	2,301	1,682
	재고량	494,271	15,283	7,855	3,864	6,576	3,349	2,578	1,574	200	17,704	5,740	4,745	7,364	5,202	6,223	6,483	8,250	3,167	387,683
라게브리오	누적	17,602	2,559	576	909	695	365	519	138	19	4,237	502	1,409	1,399	824	1,396	751	1,055	205	0
	재고량	83,296	6,845	2,872	1,417	2,991	695	1,175	496	201	6,659	1,708	1,899	3,157	1,634	2,484	2,285	2,233	585	43,920

※ 입력자의 수치 오입력 및 전일 18시 30분 이후 입력된 값 등은 당일 통계에 보정·반영하여 산출

### 붙임 5 해외 주요 국가 방역 현황 통계



**붙임 6 확진자 및 동거인 안내문 ①**

질병관리청 **경신일: 2022.4.26.**

최신 정보를 바로 확인하세요 ▶



**확진자 및 동거인 안내문 ①**



**확진자 공통안내문**

귀하는 **코로나19 검사에서 양성으로 확진**되었습니다. 빠른 대응을 위하여, **확진자의 격리 및 치료와 동거인의 권고준수사항** 등에 대해 안내드립니다. 본 안내문은 확진자에게만 통보되었으나, 동거인에게도 아래 내용을 전달하여 주시기 바랍니다.

\* 지침 변경에 따라 향후 조정될 수 있음

- 1 치료안내** **오미크론변이는 델타변이보다 중증도가 낮아 무증상, 경증 확진자는** 해열제, 감기약 복용 등 **대증치료를 통해 회복이** 가능합니다.
- ▶ 휴식과 안정을 취하면서, 수분을 충분히 섭취하세요.
  - ▶ 증상이 있을 때는 **진통해열제, 종합감기약** 등을 복용하세요.
    - 경증(인후통 등)인 경우 해열제, 감기약 등 대증치료를 통해 대체로 호전
    - 단, 중증으로 진행할 수 있는 고위험군은 항바이러스제(먹는치료제) 투약 가능
  - ▶ **발열 등 증상으로 진료가 필요하면, 외래진료센터 대면진료 또는 전화 상담·처방이** 가능합니다.
    - \*중복하여 대면진료 및 전화상담·처방을 받지 않도록 주의(코로나19 외 질환은 본인부담 발상)



- 1 격리안내** **검체채취 후 결과 확인시까지 가급적 외출을** 자제합니다. 확진자에 대한 **법정격리기간은 통지일(양성 확인일)부터 격리해제일까지이며 집(생활치료센터, 의료기관)에서 격리하게 됩니다.** **격리해제 시점은 검사일(검체채취일)로부터 7일차 자정(24:00)입니다.**

- \* 본인진료 및 처방약 수령을 위해 불가피하게 외출을 해야 할 경우
- ① 사전예약 후 의료기관 방문      ② KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용      ③ 타인과의 대면접촉 최소화
  - ④ 도보, 자차 또는 방역대시 이용      ⑤ 진료 및 약 수령 후 즉시 귀가

- ▶ **감염전파 방지를 위해 외출하지 말고 집에 머물러** 주세요. **화장실·물건 등은 동거인과 따로 사용하고 자주 소독** 하세요.
- \* 격리의무 위반 시 감염예방법에 따라 형사 고발 및 처벌 가능

- ▶ **격리해제 전 검사는 하지 않습니다.**

**1 격리해제 후 3일간 주의권고**

출근·등교 포함 외출가능하나, KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사회적일 자제

- ▶ **본 안내문은 재택치료자와 동거인이 공유하여 권고사항 준수에** 협조 바랍니다.

**붙임 7 확진자 및 동거인 안내문 ②**

질병관리청 **경신일: 2022.4.26.**

최신 정보를 바로 확인하세요 ▶



**확진자 및 동거인 안내문 ②**



**동거인 공통안내문**

**1 권고준수기간**

예방접종완료 여부에 관계없이 **재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일** - 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 신속항원검사 권고  
\* 60세이상 동거인은 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 PCR 검사 권고

**1 권고수칙**

- 동거인은 확진자의 확진 전·후 전염력 높은 시기에 공동생활을 통해** 바이러스에 노출되어 **감염 가능성이 높으므로 검사 및 모니터링이** 필요합니다.
- ▶ 동거인은 재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 **3일 이내 PCR검사\***를 받으세요. PCR 검사 후 음성으로 확인될 때까지 자택에서 대기해 주세요.
    - \* 확진자의 양성통보 문자를 전달받아 보건소 방문시 제시하면 PCR 검사를 받을 수 있음
    - \* 증상이 있는 경우 의료기관을 방문하여 신속항원검사를 받으세요. (진찰료 본인 부담 발생)
  - **6~7일차에 신속항원검사\***를 받으세요.
  - \* 가장 신속하고 접근이 쉬운 방법으로 검사(자가검사 또는 유증상시 검사서행 의료기관 방문 등) 60세 이상자의 경우에는 PCR 검사 권고. 전문가능 신속항원검사 양성시 의료진의 조치에 따름
  - ▶ **재택치료자의 검사일부터 10일 동안 다음 사항을** 준수해 주세요.
    - 가급적 외출 최소화, 출근 또는 불가피한 외출시는 KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용, 타인과의 대면접촉 최소화, 사적 모임 및 고위험시설 방문 자제, 의심증상 발생시 의료기관 방문

**1 건강관리**

- ▶ **10일 동안 매일 아침·저녁 코로나19 의심증상이 있는지** 자신의 건강상태를 확인하고, **증상 발생 시에는 의료기관을** 방문하세요.
- ▶ **코로나19 의심증상\***은 발열(37.5°C), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 등입니다.
  - 반드시 KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용 등 개인방역수칙을 철저히 준수하여 주세요.

**?** 의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간·해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영중인 **재택치료 행정안내센터** 에 문의하세요.

**1 지진 등 재난이 발생하면 이렇게 하세요!**

- ▶ 지진 등 재난 발생 시 재난 대비 국민행동요령에: 튼튼한 탁자 아래 몸을 보호에 따릅니다.
- ▶ 재택치료(자가격리) 중 지진 등 재난 발생으로 집안에서 머무르기 곤란한 경우 **외부로** 대피할 수 있습니다.
- ▶ 외부로 대피 시 반드시 마스크를 착용하고, 타인과의 접촉을 최소화하여야 합니다.

**붙임 8 재택치료 안내문 (집중관리군)**

질병관리청 **경신일: 2022.4.26.**

최신 정보를 바로 확인하세요 >



**1 건강 모니터링**

- 귀하에게 지정된 집중관리의료기관에서 연락을 드릴 예정입니다. **안내에 따라 진료지원업을 설치**해 주세요.
- 매일 건강 정보**를 측정하여 진료지원 앱에 입력해 주세요.

**1 치료 안내**

- 증상 발생 시**
  - ① 대면진료가 필요한 경우에는 **외래진료센터\***를 방문하시고, **진료를 본 후에는 즉시 귀가**하세요.
    - \* 사전예약 후, 도보, 개인차량(본인운전 가능), 방역택시 활용, KF94 마스크 착용
    - ※ 네이버·다음 카카오맵, 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr)에서 "외래진료센터" 검색 및 확인 가능
  - ② 필요 시 **재택치료 집중관리의료기관의 전화상담·처방**을 받을 수 있습니다.
  - ③ **먹는 치료제는 의사의 판단하에 처방**이 가능합니다.
    - \* 복용 중 이상반응 발생 시 의료진의 상담을 통해 복용 지속여부를 확인하시기 바랍니다.
  - ④ **숨가쁨, 해열제로 조절되지 않는 38도 이상의 발열 등 증상이 발현 또는 악화된 경우에는 집중관리의료기관으로 우선 연락 또는 외래진료센터 대면진료를 최대한 활용**하세요. 호흡곤란, 의식저하 등 **응급상황이 발생하면, 즉시 119**로 연락하시기 바랍니다.
    - \* 보건소에서 발송된 문자에 안내된 번호 참조

**1 재택치료 행정 알림 예시 (○○구 재택치료추진단) - 24시 응급콜**

- ① ○○병원 000-000-0000    ② ○○구 재택치료추진단 000-000-0000/
- ③ 위급상황으로 119 전화시 재택치료 받고있는 ○○임을 밝히세요.

**1 응급상황 관련 증상**

- 계속 가슴이 아프거나 답답한 경우     사람이 못 알아보며 헛소리 하는 경우
- 깨워도 계속 자려고 하는 경우         손톱이나 입술이 창백하거나 푸르게 변하는 경우

- 생활지원센터 재택치료 진료지원시스템을 통해 **정신건강 자기진단을 총 2회**(재택치료 시작일, 시작일+5일) 실시하고, 필요 시 **재택치료팀에 심리상담 연계**를 요청하거나, **직접 지역 정신건강복지센터(1577-0199, 24시 운영)**로 전화하셔서 심리상담을 받을 수 있습니다.

**?** 의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간-해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영중인 **재택치료 행정안내센터**에 문의하세요.

**붙임 9 재택치료 안내문 (일반관리군)**

질병관리청 **경신일: 2022.4.26.**

최신 정보를 바로 확인하세요 >



**1 건강관리**

- 휴식과 안정**을 취하면서, 스스로 **건강상태를 관찰**하세요.
- 필요 시 **통내 병·의원**과 호흡기진료 클리닉 등을 통해 **외래진료센터 대면진료 또는 전화 상담·처방**을 받을 수 있습니다.

**1 대면진료 및 전화상담·처방 안내**

- 치료가 필요한 경우, 사전예약 후 외래진료센터\***를 방문할 수 있습니다.
  - \* 도보나 개인차량(본인운전 가능), 방역택시 등을 활용하여 진료센터로 이동이 가능하며, 반드시 KF94(또는 이와 동급) 마스크를 착용하고, 진료 후에는 **즉시 귀가**하세요.
  - ※ 네이버·다음 및 카카오맵, 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr)에서 "외래진료센터" 검색 및 확인 가능
  - 대면 진료 후 **환자 본인인 약을 직접 수령**할 수 있습니다. **처방전을 받아 약국에 제출**해 주세요.
- 또는, **통내 병·의원, 호흡기전담클리닉, 호흡기 진료 지정의료기관 등에서 전화 상담·처방\***을 받을 수 있습니다.
  - \* 1일 1회 전화상담 및 처방이 가능하며(만 11세 이하 소아화장진(예방접종미대상군)는 1일 2회 가능), 중복하여 여러 의료기관에서 전화상담·처방을 받지 않도록 주의 필요 (코로나19 이외 질환의 경우 진료-처방 본인부담 발생)
  - ※ 네이버·다음 및 카카오맵, 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr)에서 "코로나19 전화상담병원" 검색 및 확인 가능
  - **전화 상담으로 처방받은 경우**, 처방의약품은 가짜 등 동거인(공동격리자 포함), 지인 등 **대리인 수령**이 원칙이나, 불가능한 경우 직접 수령도 가능합니다. 의료기관에서 처방전을 약국에 전출하면 약을 수령합니다.
  - \* 건강보험심사평가원 누리집(www.hira.or.kr)에서 재택치료를 위한 처방의약품 조제 전달이 가능한 약국 명단 확인 가능

- 이전에는 24시간 운영하는 의료상담센터\*에 전화하여 상담과 처방**이 가능합니다.
  - \* 상담센터 연락처는 관할보건소에서 발송된 안내 문자 참조

- 숨가쁨, 해열제로 조절되지 않는 38도 이상의 발열 등 증상이 발현 또는 악화된 경우에는 통내병원, 의료상담센터 비대면진료 또는 외래진료센터 대면진료를 최대한 활용**하세요. 호흡곤란, 의식저하 등 **응급상황**이 발생하면, **119** 등에 연락하세요.

**1 응급상황 관련 증상**

- 계속 가슴이 아프거나 답답한 경우     사람이 못 알아보며 헛소리 하는 경우
- 깨워도 계속 자려고 하는 경우         손톱이나 입술이 창백하거나 푸르게 변하는 경우

- 불안이나 우울 등 심리적 어려움**이 있는 경우에는 **지역 정신건강 복지센터(1577-0199, 24시간운영)**를 통해 심리상담을 받아보실 수 있습니다.

**?** 의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간-해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영중인 **재택치료 행정안내센터**에 문의하세요.

질병관리청 갱신일: 2022.4.26.

최신 정보를 바로 확인하세요



# 재택치료자의 동거인 안내문

\* 지장 변경에 따라 향후 조정할 수 있음



## ☞ 권고준수기간

예방접종완료 여부에 관계없이 **재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일**  
- 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 신속항원검사 권고  
※ 60세이상 동거인은 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 PCR 검사 권고

### 10일간의 권고수칙

- 3일이내 PCR검사를 받으세요. PCR 검사 후 음성 확인시까지 자택 대기를 권고합니다.
  - 확진자의 양성통보 문자를 전달받아 보건소 방문 재시하면 PCR 검사를 받을 수 있음
  - 음성이 있는 경우 의료기관을 방문하여 신속항원검사를 받으세요. (진찰료 본인 부담 발생)
- 이후에도 가급적 외출을 삼가하여 주시고, 출근 또는 불가피한 외출을 할 경우
  - ① KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용, ② 타인과의 대면접촉 최소화, ③ 사적 모임 및 고위험시설 방문을 자제합니다.
- 6~7일차에, 가장 신속하고 접근이 쉬운 방법으로 **신속항원검사\***를 받으세요  
(자가검사 또는 유통상시 검사시설 의료기관 방문 등)  
\* 전문가용 신속항원검사 양성시 의료진의 조치에 따름

### 가족 간 전파 예방

- 동거인은 확진자와 겹쳐서 공간을 분리하여 생활합니다.
  - 확진자와 마주할 경우, KF94(또는 동급) 마스크와 장갑을 착용합니다.
  - 확진자와 같은 공간에서 식사 및 활동을 절대 하지 않도록 합니다.
  - 환기와 표면소독(소독티슈 등을 이용)을 자주 실시합니다.
  - \* 하루 최소 3회 이상, 10분 이상 환기. 환기설비가 있을 경우 상시 가동

### 건강 관리

- 재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일 동안 매일 아침 저녁 자신의 건강상태를 확인하고, 발열, 기침 등 증상이 관찰되면 가까운 의료기관을 방문합니다.
  - 코로나19 의심증상\*은 발열(37.5℃), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 등입니다.
  - 발열 등 증상으로 진료 및 처방이 필요한 경우, 평소 이용하시는 병·의원을 방문하여 필요한 진료를 받으도록 합니다.
  - \* 진료 및 약 처방 시 본인부담금 발생함
- 동거인 중 추가 확진자가 발생할 경우, 추가 확진자는 새롭게 7일 격리합니다. 첫 재택치료자 및 다른 동거인의 추가격리는 하지 않습니다.

### 공동격리자로서의 격리

- 재택치료자가 중증장애인, 영유아·아동(만1세 이하 또는 초등학교 이하) 등 돌봄이 필요한 경우 **보호자(인원칙)**에 대하여 **관할보건소에 신청하여 공동격리자로 지정**받을 수 있습니다.  
\* 재택치료자의 격리기간 중 신청하여야 하며, 격리해제 후 신청시 소급 적용 안됨

### ☑ 지친 등 재난이 발생하면 이렇게 하세요!

- 지친 등 재난 발생 시 재난 대비 국민행동요령(예: 특정한 학자 아래 몸을 보호)에 따릅니다.
- 재택치료(자가격리) 중에도 지친 등 재난 발생으로 집안에서 머무르기 곤란한 경우 외부로 대피할 수 있습니다.
- 외부로 대피 시 반드시 마스크를 착용하고, 타인과의 접촉을 최소화하여야 합니다.

- 의학적 상담 이의, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간-해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영중인 **재택치료 행정안내센터**에 문의하세요.

## 붙임 10 재택치료자 동거인 안내문

## 붙임 11 유전자검사(PCR) 우선순위 대상 안내문

질병관리청

# 유전자검사(PCR) 우선순위 대상

### • 검사대상자별 증빙자료

검사대상자	증빙자료
만 60세 이상 고령자 만 60세 이상 고령자	주민등록증, 운전면허증 등 신분증 *주민등록상 읍면연도 기준
코로나19 의심증상이 있는 자 의료기관 내 의사 소견에 따라 코로나19 검사가 필요한 자	의사의 소견서, 병원의 경과기록지 등
역학적 연관성이 있는 자 밀접접촉자(확진자와 접촉한 자)	검사대상 지정 문자(밀접접촉자 통보 문자), PCR검사 대상 학교장 확인서 등
격리 해제 전 검사자(수동감시자 포함)	격리통지서, 밀접접촉자 통보 문자, 격리 통보 문자
해외입국자(해외에서 국내로 입국한 자)	해외 입국 후 검사 관련 안내 문자, 격리통지서, 격리면제서 등 해외입국자임을 확인할 수 있는 자료
감염취약시설 선제검사 요양병원 등 고위험시설* 근무자	재직증명서, 사원증 등
외국인보호시설·소년보호기관· 교정시설 입소자	보호명령서, 입원(소년원, 소년부류심사원) 통지서, 또는 안내문(통보 문자)
휴가 복귀 장병	휴가증
의료기관 입원 전 환자 및 상주 보호자(또는 간병인) 1인	입원환자의 입원 관련 증명 서류, 문자 등
신속항원·응급선별 검사 양성자 신속항원검사(전문가용, 개인용) 양성자, 의료기관 응급선별검사 양성자	의사소견서(신속항원검사 양성 포함), 양성이 확인된 신속항원검사 제품(밀봉하여 제출) 등

\* 고위험시설 : 요양병원, 요양시설, 정신병원, 정신요양시설, 정신재활시설, 양로시설, 노인복지시설, 한방병원, 재활병원(기초 선제검사 대상 기관에 한함)

**붙임 12** 개인방역 6대 중요수칙

개인방역 6대 중요수칙

2022. 4. 26.

- 수칙1** 코로나19 예방접종 완료하기
- 수칙2** 올바른 마스크 착용으로 입과 코 가리기, 실내 음식물 섭취 등 마스크를 벗는 시간은 가능한 짧게
- 수칙3** 흐르는 물에 30초 비누로 손 씻기, 기침할 땐 옷소매로
- 수칙4** 1일 3회(회당 10분) 이상 환기, 다빈도 접촉부위 1일 1회 이상 주기적 소독
- 수칙5** 사적 모임의 규모와 시간은 가능한 최소화 하기
- 수칙6** 코로나19 증상 발생시 진료받고 집에 머물며 다른 사람과 접촉 최소화

**붙임 13** 면역저하자 코로나19 예방접종 안내문

면역저하자 코로나19 예방접종 안내문

1. 면역저하자의 안전을 위해 코로나19 예방접종이 필요합니다.
  - 면역저하자는 기저 질환의 상태 또는 면역체계를 억제하는 치료를 받고 있기 때문에 **면역 체계가 약화되어 있어, 코로나19 감염에 취약합니다.** 면역저하자는 3회접종이 기초접종에 해당하며, **면역강화를 위해 3회 접종 완료일로부터 4개월 이후 추가(4차)접종을 받기를 권고합니다.**

기초접종		추가(4차)접종
1·2차 접종	3차 접종 간격	
백신별 접종간격 준수	2차접종 2개월 후	3차접종 4개월 후
2. 기초접종(3회) 후 추가(4차)접종이 필요한 대상자는 아래와 같습니다. 해당되시는 분은 추가(4차)접종 필요 여부에 대해 **담당의사와 상의하시고 접종받으시기 바랍니다.**
  - 종양 또는 혈액암으로 항암 치료를 받고 있는 경우
  - 장기이식 수술을 받고 면역억제제를 복용 중인 경우
  - 조혈모세포 이식 후 2년 이내인 환자 또는 이식 후 2년 이상 경과한 경우라도 면역억제제 치료를 받는 경우
  - 일차(선천)면역결핍증(항체결핍, DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome 등)
  - HIV 감염 환자(현재 CD4+ T 세포수 200/uL 미만)
  - 고용량의 코르티코스테로이드 또는 면역을 억제할 수 있는 약물로 치료를 받고 있는 경우
  - 이외에도, 상기 기준에 준하는 면역저하자로서 추가(4차)접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 가능
3. 안전한 접종을 위해 ①**접종 전 담당의사와 상담**, ②**접종 후 건강상태에 유의하여 주시기 바랍니다.**
  - **접종 전 담당의사와 상의 후** 접종할 것을 권고드립니다.
  - 3차접종을 면역저하자로 접종하지 않은 경우에도, 의료기관에서 받은 면역저하질환 진료확인서 또는 담당의사의 접종 권고를 포함한 소견서 등을 지참하면, 접종 의료기관에서 추가(4차)접종을 받으실 수 있습니다.

붙임 14 만 5-11세 소아 코로나19 예방접종 안내문

질병관리청 2022.04.07

5~11세 소아용

# 코로나바이러스감염증-19 (코로나19) 예방접종 안내문

**Q1 백신을 왜 맞아야 하나요?**

- 오미크론 변이의 우세종화로 확진자가 급증하면서 그동안 접종대상에 포함되지 않았던 소아(5-11세)에서의 확진자도 급증하고 있으며, 중증 및 사망자도 발생하고 있습니다.

비교	소아(5-11세)	청장년(18-59세)
인구수	3,180,414명	31,167,083명
확진자수	704,853명	3,815,455명
위중증 환자 (중증화율)	20명 (0.005%)	4,013명 (0.233%)
사망자 (사망률)	4명 (0.001%)	675명 (0.033%)
발생률 (인구 10만명당)	22,162명	12,241명

5-11세 주간 발생현황 (확진, 위중증 및 사망) (22년 1월 이후)

5-11세 누적 발생현황\* (확진, 위중증 및 사망) (3.12일 0시 기준)

- 5-11세 소아의 경우 누적 발생률(인구 10만명당)이 22,162명으로 다른 연령층\* 대비 제일 높습니다.
  - \* 누적 발생률(인구 10만명당) : (12-17세) 17,526명, (18-59세) 12,241명
- 소아에서 코로나19로 인한 위중증 환자는 현재까지 20명, 사망자는 4명이며, 다기관염증증후군(MIS-C) 환자는 10명이 발생하였습니다. 특히, 위중증 환자의 70%, 사망자의 50%가 기저질환자 이었던 것으로 확인되었습니다.
  - \* 소아 위중증, 사망, 다기관염증증후군 환자 누적 발생기간 : '20.1.20.-22.2.28.
- 소아는 코로나19 감염 시 성인에 비해 무증상 또는 경증 비율이 높지만, 기저질환을 가진 소아는 코로나19 감염으로 인한 중증화 위험이 상대적으로 높은 것으로 보고되고 있습니다.
- 여러 연구에서 코로나19 백신은 코로나19 감염에 따른 중증화 및 사망 예방에 효과적이라는 것이 확인되었으므로 예방접종을 통해 5-11세 소아를 코로나19 감염에 따른 중증화 및 사망으로부터 보호할 수 있습니다.

1/6

질병관리청

2022.04.07

- 미국, 유럽 등 62개 국가\*에서 소아용 백신을 긴급승인 또는 허가하여 예방접종을 시행하거나 시행 준비 중에 있습니다.
  - \* 국외 소아 1차 접종률 : 싱가포르 72%, 캐나다 56.7%, 호주 50.9%, 미국 33%, 독일 21.3%
- 5-11세 소아 대상 기초접종은 고위험군을 비롯한 소아에서의 중증화 및 사망 예방을 목표로 시행하고자 합니다.

Q2 소아(5-11세)에게 사용 가능한 코로나19 백신은 무엇인가요?

- 화이자사에서 만 5-11세 소아 대상으로 별도로 개발된 백신으로 소아의 안전성을 고려하여 유효성분 용량이 성인용 백신의 1/3 수준입니다.

백신제품	허가 연령*	유효성분 용량 (투여 용량)	접종횟수	백신종류**
코미나티주 0.1mg/mL(5-11세용) (주사액)	5-11세	10µg (주사액 0.2mL)	2회	mRNA

\* 만 5-11세 소아(주인동태상 2017년생 생일 이후인 소아-2010년생 생일 전인 소아) 접종 가능  
\*\* mRNA 백신(mRNA)은 코로나19 바이러스의 표면항원 유전자를 RNA 형태로 몸에 주입하여 체내에서 표면항원 단백질을 생성해 면역반응을 유도합니다. 생백신이 아니므로 백신에 코로나19 감염을 유발하지는 않습니다.

Q3 꼭 맞아야 하는 대상이 있나요?

- 소아당뇨, 비만, 만성폐질환 등 기저질환이 있는 고위험군\* 소아의 경우 건강한 소아보다 코로나19에 감염되는 경우 중증으로 진행될 가능성이 상대적으로 높습니다.
- 국내 관련 학회 권고 및 전문가 자문위원회에서 이미 권고한 바와 같이 기저질환이 있는 고위험군 소아의 경우 코로나19 중증 감염을 예방할 수 있으므로 예방접종을 받으실 것을 적극적으로 권고합니다.
- 건강한 소아의 경우에도 백신의 감염예방 효과와 안전성이 입증된 만큼 예방접종의 이득과 코로나19 감염, 접종 후 이상반응 관련 위험에 대해 충분히 검토하신 후 예방접종 여부를 결정하시어 자율적으로 접종을 시행 하시기를 권고 드립니다.
  - \* 감염된 아령이 있는 경우 접종 미권고, 1차접종 후 감염된 경우 2차접종 미권고

**고위험군 범위**

- ▶ 만성폐질환, 만성심장질환, 만성간질환, 만성신질환, 신경-근육질환
- ▶ 당뇨, 비만, 면역저하자(면역억제제 복용자)
- ▶ 만성질환으로 사회복지시설 등 집단시설에서 치료, 요양, 수용 중인 소아
- ▶ 이외에도, 상기 기준에 준하는 고위험군 5-11세 소아로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 권고

질병관리청

2022.04.07

Q4 백신이 효과적인가요?

- 백신 제조사가 식약처에 제출한 미국 등 4개 국가의 임상시험에서, 소아용 백신을 접종한 5~11세와 성인용 백신을 접종한 16~25세의 **면역반응은 유사하게 나타났습니다**(2차접종 1개월 경과). 또한 **감염예방 효과는 90.7%**로 확인(2차접종 7일 경과) 되었습니다.
- 미국의 연구에서, 오미크론 변이 유행 기간 동안 5~11세의 **긴급치료 예방효과**가 2차접종(14~67일)을 완료하면 **51%**이며, 델타 및 오미크론 변이 유행 기간 동안 5~11세의 **입원 예방효과**는 2차접종(14~67일)을 완료하면 **74%**로 확인되었습니다. [질병 발생·사망을 주간 보고서 자료(22.3.1.)]

Q5 백신은 안전한가요?

- 백신 제조사가 식약처에 제출한 미국 등 4개 국가의 임상 시험에서, 약물관련 중대한 이상사례는 보고 되지 않았으며, 전반적인 안전성 정보는 16~25세와 유사했습니다. **대부분 경증에서 중간 정도 수준으로 3일 이내 증상이 소실**되었습니다.
- 미국 질병예방통제센터(CDC)에서 **이상반응 자동감시체계를 통해 발표한 결과에 따르면**, 5~11세 소아를 대상으로 약 870만 건의 예방접종 후 4,249건에서 이상반응이 보고되었으며, 대부분 **구토, 발열, 두통** 등 일반 이상반응(97.6%)이었습니다. [미국 예방접종전문위원회(ACIP) 자료(22.1.5.)]
  - \* 일반 이상반응 : 구토(7.5%) > 발열(7.0%) > 두통(6.1%)
  - \*\* 중대한 이상반응 : 트로보닌 증가(0.4%) > 유행성(0.3%) > C-단백질(염증수치) 증가(0.3%)

Q6 백신을 접종하려면 어떻게 해야 하나요?

- 접종 일정** 사전예약은 3월 24일(목)부터 가능하며, 접종은 3월 31일(목)부터 시행할 예정입니다.
- 예약 방법**
  - 당일접종** 의료기관 예비명단(유선 확인) 등록
  - 사전예약** 온라인(본인 및 대리예약, ncvr.kdca.go.kr), 전화예약(1339, 지자체콜센터) 후 예약일에 개별적으로 접종기관 방문
- 접종 방법** 소아의 경우 **접종의 안전성 및 이상반응 모니터링을 위해 보호자 또는 법정대리인 동반이 반드시 필요합니다**. 보호자는 소아와 함께 방문하여 본인 확인 후 접종기관에서 예약표를 작성합니다.
- 접종 기관** 소아접종 지정 위탁의료기관은 약 1,200개소 의료기관이며, 소아접종 지정 위탁의료기관은 안전성을 최우선으로 **접종역량, 응급대응, 접근성 등을 고려하여 선정**하였습니다. 소아접종 지정 위탁의료기관 목록은 3월 14일(월)부터 코로나19 예방접종 누리집(ncvr.kdca.go.kr)에서 통해 확인할 수 있습니다.
  - \* "알약·서약" > "지침" 메뉴에서 실시기준, 안내문, 교육자료, 위탁의료기관 확인 가능
- 접종 간격** 1차접종 후 2차접종은 8주(56일) 간격으로 접종할 수 있습니다.
  - \* 의학적 사유 또는 개인 사정에 따라 초기에 2차접종이 필요한 경우, 식약처 허가 간격인 3주(21일) 범위 내로 접종 가능함

3/6

질병관리청

2022.04.07

Q7 코로나19 예방접종 전·후 주의사항은 무엇인가요?

접종 전	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 건강 상태가 좋을 때, 의사의 예진 후 접종 받기</li> <li>▶ 코로나19 감염이 의심되거나 발열(37.5°C 이상)등 급성병증이 있는 경우 접종을 연기</li> </ul>
접종 시	▶ 백신은 어깨 가까이에 주사합니다. 어깨 내릴기 쉬운 옷으로 준비하기
접종 후	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머무르며 이상반응 발생여부 관찰하기</li> <li>▶ 귀가 후 3시간 이상 주의 깊게 관찰하고 일주일 정도는 고강도의 운동 및 활동 자제하기</li> <li>▶ 접종부위는 청결하게 유지하며 평소와 다른 신체 증상이 나타나는 경우의사의 진료 받기</li> </ul>

**! 단! 다음과 같은 경우 코로나19 예방접종을 받아서는 안됩니다!**

- ▶ 코로나19 백신 구성 성분에 대한 아나필락시스\*와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우
- ▶ 1차 코로나19 예방접종 후 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우, 2차 접종 금지
  - \* 아나필락시스 : 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종, 볼 전체의 발진, 빠른 심장 박동, 현기증, 쇼크 등의 증상과 동반한 심각한 알레르기 반응

★ 약(항 세척제 등), 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 등에 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 기록해 주세요 ★

Q8 코로나19 예방접종 후 발생 가능한 이상반응은 무엇인가요?

- ▶ 예방접종 후 **접종부위 통증이나 부기, 발적, 발열, 피로감, 두통, 근육통, 오한, 메스꺼움** 등이 나타날 수 있음
- ▶ 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종 등을 동반한 **아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응**이 나타날 수 있음
- ▶ mRNA 백신(화이자, 모더나) 접종 후 **가슴 통증, 압박감, 불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡기 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 증상**이 나타나는 **심근염·심낭염**이 발생할 수 있음

Q9 코로나19 예방접종 후 이상반응이 나타나면 어떻게 해야 하나요?

- ▶ **접종부위 부기, 통증**이 있는 경우 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질 하기
- ▶ **미열**이 있는 경우, 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하기

4/6

질병관리청

2022.04.07

- **발열이나 근육통** 등으로 불편함이 있는 경우 **해열진통제를 복용**하기
  - 예방접종 전 아세트아미노펜 성분의 해열진통제 준비, 예방접종 후 통증 증상이 나타날 경우 해열진통제 복용
- **다음과 같은 경우에는 의사의 진료를 받으세요**
  - 가슴통증, 압박감, 불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우
  - 접종부위의 통증, 부기, 발적이나 발열 등이 **접종 후 2일이 지나도 호전되지 않거나 악화되는 경우**
  - 접종 후 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타나는 경우
- **다음과 같은 경우에는 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하세요**
  - 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우, 입술·얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
    - 나이가 어릴수록 증상표현이 미숙할 수 있으나 접종 이후 최소 3일간의 세심한 관찰이 필요합니다.

이상반응이 의심될 경우 1339 또는 관할 보건소에 문의하시기 바라며, 예방접종도우미 누리집 (<https://nip.kdca.go.kr>) 내 '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대처법을 확인할 수 있습니다.

**Q10** 소아 접종자 대상 피해보상 및 지원 체계는 어떻게 운영되나요?

- 현재 질병관리청에서는 코로나19 백신접종 이후 이상반응에 대해 다양한 분야별 전문가로 구성된 **예방접종피해보상 전문위원회에서 보상 심의**를 거쳐 인과성이 인정되는 경우 **피해보상을 실시**
  - 코로나19 예방접종 피해보상은 이상반응 신고를 전제로 하며 이상반응 신고는 **예방접종 후 이상반응이 발생 시 진단한 의사가 보건소에 신고**하도록 되어있으며, **의료기관에서 신고가 되지 않을 시** 접종받은 분 또는 보호자가 **예방접종도우미사이트(nip.kdca.go.kr)** 또는 **"코로나19 예방접종 후 전송받은 건강상태 확인하기"**를 통해 직접 신고 가능함
  - **피해보상 신청**은 이상반응 신고와 별도로 **구비서류**를 갖춰 관할 보건소에 제출하여야 하며, 구비 서류의 종류 및 서식은 **코로나19 예방접종누리집(www.코로나19예방접종.kr)**에서 확인 가능함
  - 예방접종 피해보상 신청을 하시면 지방자치단체의 기초피해조사, 예방접종피해조사반의 정밀피해조사, 예방접종피해보상 전문위원회의 인과성 심의를 거쳐 **보상 여부**가 결정됨
- 한편, 인과성 근거 불충분(심의 기준④~1)으로 보상에서 제외된 경우에도 인과성 불충분 지원 사업에 따라 **의료비(1인당 3천만원 상한)** 또는 **사망자 위로금(1인당 5천만원)**을 지원하고 있음
  - 대상자 또는 보호자는 **지원신청 구비서류**를 갖춰 **주소지 관할 보건소**에서 **의료비 및 사망자 위로금 지원**을 신청할 수 있으며, 서류 및 지원 금액 검토 등을 거쳐 지원 받을 수 있음

5/6

질병관리청

2022.04.07

[ 심의 기준 표 ]

구분	심의 기준	보상 여부
① 인과성이 명백한 경우	백신을 접종한 확실한 증거를 확보하였고, 예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 있으며, 어떤 다른 이유보다도 백신 접종에 의한 인과성이 인정되고, 이미 알려진 백신 이상반응으로 인정되는 경우	피해보상
② 인과성이 개연성이 있는 경우	백신을 접종한 확실한 증거를 확보하였고, 예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 있으며, 어떤 다른 이유보다도 백신에 의한 인과성이 인정되는 경우	
③ 인과성이 가능성이 있는 경우	백신을 접종한 확실한 증거를 확보하였고, 예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 있으며, 이상반응이 다른 이유 보다는 예방접종으로 인해 발생했을 가능성이 동일하거나 더 높은 경우	인과성 불충분 환자 의료비 및 사망위로금 지원
④ 인과성이 인정되기 어려운 경우	예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 있으나, ① 백신과 이상반응에 대한 자료가 충분하지 않거나(④-1) ② 백신보다는 다른 이유에 의한 가능성이 더 높은 경우(④-2)	
⑤ 명확히 인과성이 없는 경우	① 백신을 접종한 확실한 증거가 없는 경우나 ② 예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 없는 경우 ③ 또는 다른 명백한 원인이 밝혀진 경우	보상 및 의료비 지원 제외

**Q11** 백신접종 후 중증 이상반응이 있어 국가보상을 신청하였으나 인과성 부족으로 피해보상을 받지 못했습니다. 질병청의 국가보상 제도 외 피해보상을 받을 수 있는 제도가 있는지요?

- 교육부는 접종 당시 만 18세 이하 청소년(만 5~11세 소아 포함)을 대상으로 **「학생 백신접종 이상반응 건강회복 지원 사업」**을 '22.2월부터 시행하고 있으며 지원대상은 다음과 같습니다.

**사업 기간** '22.2. ~ '23.5월(코로나19 확산 및 의료비 지원 신청 상황 등 고려 연장 가능)

**지원 대상** 접종 당시 만 18세 이하 청소년(만5~11세 소아 포함)


**지원 요건** 접종 이후 90일 내 발생한 **중증 이상반응** 등으로 인해 국가보상을 신청했으나, **인과성이 인정되기 어려워 보상을 받지 못한 경우**\*

- \* 중상의 유형과 관계없이 국가보상 신청액수가 본인부담금 기준 30만원 이상인 경우 지원
- \* 백신보다 다른 이유에 의한 가능성이 더 높은 경우로서 예방접종 피해보상 심의기준(4~2) 유형에 해당

**지원 금액** 개인별 총액 **5백만원** 한도 내 **의료비** 등 지급

\* 단, 교육 급여 대상자(중위소득 50% 이하)는 의료비 최대 1천만 원 한도 내 지원

[ 교육부, 소아·청소년 백신 이상 반응 건강회복 지원 사업 : 의료비 지원 절차 ]



6/6

붙임 15 청소년 코로나19 예방접종 안내문(청소년용)

질병관리청 2022.04.07

12~17세 청소년 3차접종

# 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 예방접종 안내문

**Q1 3차접종을 왜 맞아야 하나요?**

- 오미크론 변이의 우세종화로 확진자가 급증하고 있으며, 기초접종 후 시간이 경과한 청소년(12~17세)에서의 확진자도 급증하고 지속적으로 위중증 환자 및 사망자도 발생하고 있습니다.

비교	청소년(12~17세)	총장년(18~59세)
인구수	2,773,041명	31,167,083명
확진자수	488,007명	3,815,455명
위중증 환자 (중증화율)	38명 (0.012%)	4,013명 (0.233%)
사망자 (사망률)	2명 (0.001%)	679명 (0.033%)
발생률 (인구 10만명당)	17,629명	12,241명

12~17세 주간 발생현황 (확진, 위중증 및 사망) (2.21. 1일 이후)

12~17세 누적발생현황\* (확진, 위중증 및 사망) (3.12. 1일 기준)

\* 단말기간: '21.11.18.~'22.3.18. (22.3.12. 24. 기준) 중증화율 및 사망률 산출기간: '21.11.18.~'22.3.18.

- 기초접종 후 시간이 경과함에 따라 최근 국내 청소년의(3.12일 0시 기준) 누적 발생률(인구 10만명당)이 17,526명으로 청장년층(18~59세)\* 대비 높게 발생하고 있습니다.  
\* 누적 발생률(인구 10만명당): (18~59세) 12,241명
- 청소년에서 코로나19로 인한 위중증 환자는 현재까지 26명, 사망자는 2명이며, 코로나19 합병증인 다기관염증후군은 총 4건이 발생했습니다. 특히, 위중증 환자의 92.2%, 사망자의 100%가 기저질환이었던 것으로 확인되었습니다.
- 미국 FDA는 12세 이상 3차접종 긴급사용 승인(1.3일, 화이자)했고 유럽 의약품청도 12세부터 3차접종이 가능하도록 승인·권고(2.24일) 하였으며, 미국, 이스라엘, 싱가포르, 프랑스·독일 등 유럽연합 10개국, 영국 등에서 청소년 3차접종을 권장하고 있습니다.
- ▶ 청소년 대상 3차접종은 고위험군을 비롯한 청소년을 코로나19 감염으로 인한 중증·사망으로부터 청소년을 보호하기 위하여 시행하고자 합니다.

1/5

질병관리청

2022.04.07

**Q2 청소년 3차접종 대상은 누구인가요?**

**Q3 백신을 접종하려면 어떻게 해야 하나요?**

**Q4 3차접종은 효과적인가요?**

- 미국 CDC가 발표한 <질병 발병·사망을 주간보고서(MMWR)>(22.03.01.)에 따르면, 오미크론 변이 유행 기간 동안 16~17세 연령층에서 3차접종까지 마친 경우(접종 7일후), 2차접종자(접종 14일~149일후)에 비해 응급실 및 긴급치료 예방효과가 47%(34%→81%) 상승하는 것으로 나타났습니다.

**Q5 3차접종은 안전한가요?**

- 미국 CDC가 <이상반응 수동감시체계(VARES)>를 통해 발표한 결과에 따르면, 16~17세 연령층의 3차접종 후 이상반응은 대부분(96%) 발열, 두통, 구토 등 일반 이상반응으로 확인되었습니다.
- 또한, 독일 연방 보건부 관할 연구소(PfE)의 보고(22.02.07.)에서도, 12~17세의 3차접종 이후 이상반응은 주로 주사부위 통증, 두통, 피로, 발열이었고, 신고건수는 3차접종이 기초접종보다 낮은 수준으로 확인되었습니다.

**Q6 코로나19 예방접종 전·후 주의사항은 무엇인가요?**

접종 전	접종 후
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 건강상태가 좋을 때, 접종하기</li> <li>▶ 다음과 같은 경우 예방접종 연기하기                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19 감염이 의심되는 경우</li> <li>- 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자</li> <li>- 발열(37.5°C 이상) 등 급성병증이 있는 경우</li> <li>- 1차 mRNA 코로나19 백신(화이자) 접종 후 심근염/심낭염 발생이 확인된 경우</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머무르며 이상반응 발생여부 관찰하기</li> <li>▶ 귀가 후 3시간 이상 주의 깊게 관찰하고 일주일 정도는 고강도의 운동 및 활동 자제하기</li> <li>▶ 접종부위 청결하게 유지하기</li> <li>▶ 평소와 다른 신체 증상이 나타나는 경우 의사의 진료 받기</li> </ul>

**⚠ 단! 다음과 같은 경우 코로나19 예방접종을 받아서는 안됩니다!**

- ▶ 코로나19 백신 구성 성분에 대한 **아나필락시스\***와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타나는 경우
  - \* 아나필락시스: 호흡곤란, 얼굴의 붓기, 눈 또는 입술/입안의 부종, 땀, 천식의 발작, 빠른 심장 박동, 현기증, 소근 등의 증상을 동반한 심각한 알레르기 반응

★ 약(항생제 등), 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 등에 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 기록해 주세요 ★

**Q7 코로나19 예방접종 후 발생 가능한 이상반응은 무엇인가요?**

- 예방접종 후 **접종부위 통증**이나 **부기, 발적, 발열, 피로감, 두통, 근육통, 오한, 메스꺼움** 등이 나타날 수 있음
- 호흡곤란, 얼굴의 붓기, 눈 또는 입술/입안의 부종 등을 동반한 **아나필락시스**와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타날 수 있음
- mRNA 백신(화이자, 모더나) 접종 후 **가슴 통증, 압박감, 불편감, 호흡곤란**이나 **숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신** 증상이 나타나는 **심근염·심낭염**이 발생할 수 있음

이상반응 발생이 의심될 경우 1339 또는 관할 보건소에 문의하시기 바라며, 예방접종도우미 누리집 (<https://nip.kdca.go.kr>) 내 '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대처법을 확인할 수 있습니다.

**Q8 소아 접종자 대상 피해보상 및 지원 체계는 어떻게 운영되나요?**

- 현재 질병관리청에서는 코로나19 백신접종 이후 이상반응에 대해 다양한 분야별 전문가로 구성된 **예방접종피해보상 전문위원회**에서 **보상 심의**를 거쳐 인과성이 인정되는 경우 **피해보상**을 실시
  - 코로나19 예방접종 피해보상은 이상반응 신고를 전제로 하며 이상반응 신고는 **예방접종 후 이상반응이 발생 시 진단한 의사가 보건소에 신고**하도록 되어있으며, **의료기관에서 신고가 되지 않을 시** 접종받은 분 또는 보호자가 **예방접종도우미사이트(nip.kdca.go.kr)** 또는 "**코로나19 예방접종 후 전송받은 건강상태 확인하기**"를 통해 직접 신고 가능함
  - **피해보상 신청**은 이상반응 신고와 별도로 구비서류를 갖춰 관할 보건소에 제출하여야 하며, 구비 서류의 종류 및 서식은 **코로나19 예방접종누리집(www.코로나19예방접종.kr)**에서 확인 가능함
  - 예방접종 피해보상 신청을 하시면 지방자치단체의 기초피해조사, 예방접종피해조사반의 정밀피해조사, 예방접종피해보상 전문위원회의 **인과성 심의**를 거쳐 **보상 여부**가 결정됨
- 한편, 인과성 근거 불충분(심의 기준④-1)으로 보상에서 제외된 경우에도 인과성 불충분 지원 사업에 따라 **의료비(1인당 3천만원 상한)** 또는 **사망자 위로금(1인당 5천만원)**을 지원하고 있음
  - 대상자 또는 보호자는 **지원신청 구비서류**를 갖춰 **주소지 관할 보건소**에서 **의료비 및 사망자 위로금 지원**을 신청할 수 있으며, 서류 및 지원 금액 검토 등을 거쳐 지원 받을 수 있음

[ 심의 기준 표 ]

구분	심의 기준	보상여부
① 인과성이 명백한 경우	백신을 접종한 확실한 증거를 확보하였고, 예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 있으며, 어떤 다른 이유보다도 백신 접종에 의한 인과성이 인정되고, 이미 알려진 백신 이상반응으로 인정되는 경우	피해보상
② 인과성에 개연성이 있는 경우	백신을 접종한 확실한 증거를 확보하였고, 예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 있으며, 어떤 다른 이유보다도 백신에 의한 인과성이 인정되는 경우	
③ 인과성에 가능성이 있는 경우	백신을 접종한 확실한 증거를 확보하였고, 예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 있으며, 이상반응이 다른 이유 보다는 예방접종으로 인해 발생했을 가능성이 통찰되거나 더 높은 경우	
④ 인과성이 인정되기 어려운 경우	예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 있으나,	인과성 불충분 환자 의료비 및 사망유류금 지원
	① 백신과 이상반응에 대한 자료 불충분하거나(0-1) ② 백신보다는 다른 이유에 의한 가능성이 더 높은 경우(0-2)	교육부 지원
⑤ 명확히 인과성이 없는 경우	① 백신을 접종한 확실한 증거가 없는 경우나 ② 예방접종 후 이상반응이 발생한 시기가 시간적 개연성이 없는 경우	보상 및 의료비 지원 제외
	③ 또는 다른 명백한 원인이 밝혀진 경우	

**Q9 백신접종 후 중증 이상반응이 있어 국가보상을 신청하였으나 인과성 부족으로 피해보상을 받지 못했습니다. 질병청의 국가보상 제도 외 피해보상을 받을 수 있는 제도가 있는지요?**

\* 교육부는 접종 당시 만 18세 이하 청소년(만 5~11세 소아 포함)을 대상으로 「학생 백신접종 이상반응 건강회복 지원 사업」을 '22.2월부터 시행하고 있으며 지원대상은 다음과 같습니다.

- 사업 기간** '22.2월 ~ '23.5월(코로나19 확산 및 의료비 지원 신청 상황 등 고려 연장 가능)
- 지원 대상** 접종 당시 만 18세 이하 청소년(만5~11세 소아 포함)
- 지원 요건** 접종 이후 90일 내 발생한 **중증 이상반응**\* 등으로 인해 국가보상을 신청했으나, 인과성이 인정되기 어려워 보상을 받지 못한 경우\*\*
  - \* 중상의 유형과 관계없이 국가보상 신청예수가 분인부담금 기준 30만원 이상인 경우 지원
  - \*\* 백신보다는 다른 이유에 의한 가능성이 더 높은 경우로서 예방접종 피해보상 심의기준(0-2) 유형에 해당
- 지원 금액** 개인별 총액 5백만 원 한도 내 의료비 등 지급  
\* 단, 교육 급여 대상자(중위소득 50% 이하)는 의료비 최대 1천만 원 한도 내 지원

[ 교육부, 소아-청소년 백신 이상 반응 건강회복 지원 사업 : 의료비 지원 절차 ]



**붙임 16 12-17세 청소년 3차접종 안내문**

코로나바이러스감염증-19(코로나19)  
**예방접종 안내문**



**Q1 청소년(12~18세)에게 사용 가능한 코로나19 백신은 무엇인가요?**

백신제품	허가 연령	접종횟수	접종간격
화이자 백신	12세 이상*	3회**	1~2차(8주), 2~3차(3개월)

\* 2010년생 안12세는 생일이후 접종 가능(18세 이상은 mRNA 백신, 코기노, 노바백스 가능)  
\*\* 2차접종 대상: 12-17세 전체(고위험군 우선 권고), 18세 이상  
※ 백신 백신(mRNA)은 코로나19 바이러스의 표면 단백 유전자를 PNA 형태로 들어 주입하여 체내에서 표연한 단백질을 생성하여 면역반응을 유도합니다. 생백신이나 mRNA 백신이 코로나19 감염을 유발하지는 않습니다.

**Q2 백신을 왜 맞아야 하나요?**

\* 최근 전염력이 높은 오미크론 변이 확산에 따라 청소년 감염 위험이 더 높아지고 있고, 실제 청소년 확진자 발생이 계속해서 증가하고 있습니다.



\* 건강한 청소년도 감염되면 **위중증**으로 진행될 위험이 존재합니다. 코로나19 확진된 18세 이하 청소년의 약 16.1%가 의료기관에 입원하였으며 다기관염증증후군과 같은 합병증 발생은 15명(11세 이하 11명 포함)(21.12.28일 기준) 청소년에게서 발생한 바 있습니다.

\* 미국, 일본, 캐나다 등 대부분의 국가에서는 12세 이상 청소년(일본 국가는 5세 이상)에게 코로나19 예방접종을 시행 중입니다.

질병관리청

2022.04.07

- 우리나라 청소년 **접종률은 꾸준히 증가**하고 있으나 아직까지 다른 연령대에 비해 접종률이 낮아 **감염이 쉽게 확산**할 수 있습니다. 특히 청소년은 **무증상감염**이 많아 조기발견이 어려워 가정 및 단체 집단 등에서 감염이 상당히 **전파된 이후에 발견**되고 있습니다.
  - '21.12.12~'22.1.8.까지 4주간 교육시설(4,245건, 12.4%), 종교시설(214건, 0.6%), 가족·지인 모임(152명, 0.4%) 등으로 집단감염 발생
- 코로나19 감염으로 **입원, 위중증**으로 진행될 위험이 있고, **격리 및 등교중지에 따른 학습권의 침해, 심리적 위축, 정신건강 피해** 등 다양하고 심각한 영향을 받을 수 있습니다.
- 코로나19 백신은 코로나19 감염을 예방하고, 감염시 중증·사망을 막아주므로 **코로나19로부터 청소년 본인**과 가족의 건강을 보호해 줍니다.
- 델타 변이에 이어 오미크론 변이 확산 등 방역 상황에 따라 최근 들어 감염 위험성이 훨씬 증가하여 **예방접종의 이득이 더욱 커지고** 있습니다.

Q3 꼭 맞아야 하는 대상이 있나요?

- 12세 이상 모든 청소년에게 코로나19 예방접종을 권고하고 있습니다.
- **건강한 청소년도** 예방접종으로 **코로나19 중증 감염**과 다기관염증증후군과 같은 **합병증을 예방**할 수 있으므로 **예방접종**을 받으실 것을 권고합니다.
- 특히 소아당뇨, 비만 등 내분비 질환, 심혈관 질환, 만성신장질환, 만성호흡기질환, 신경계질환, 면역저하자 등 **기저질환이 있는 청소년**의 경우 건강한 청소년보다 코로나19 감염 시 중증으로 진행될 위험이 최대 7배 이상 높은 것으로 알려져 있어 **예방접종을 적극 권고**합니다.

Q4 백신이 효과적인가요?

- 확진자에서 예방접종력에 따른 중증 진행을 평가한 결과 '3차접종 후 확진군'은 '미접종 후 확진군'에 비해 중증(사망 포함)으로 진행할 위험이 97.5%, '2차접종 후 확진군'도 '미접종 후 확진군'에 비해 **67.1% 낮게** 나타났습니다. ('22.2.20, 기준)
  - 즉, '미접종 후 확진군'의 중증률은 '3차접종 완료 후 확진군'에 비해 39배, '2차접종 완료 후 확진군'에 비해 3배 높게 나타났습니다.
- 미국에서도 오미크론 유행 시기 백신 미접종 대상군에서 입원율이 백신완료군에 비해 3배 이상 높은 것으로 나타내서 **코로나19 감염 예방에 매우 효과적**인 것으로 확인되었습니다.

2/4

질병관리청

2022.04.07

Q5 백신은 안전한가요?

- 청소년 접종에 사용되는 화이자 백신은 우리나라 식품의약품안전처를 비롯하여 미국 FDA 유럽의약품안전청(EMA) 등 각 국가 및 국제기구에서 안전성이 확인되었습니다.
- **국내 12-18세** 코로나19 예방접종 10만 건 당 이상반응 의심사례 신고율은 313.7건으로 전체 인구의 신고율(386.1건)의 81% 수준(20~30대 신고율의 63~66% 수준)이 확인되었습니다. ('22.3.31, 기준) **전체 이상반응 신고(18,548건)의 대부분은 일반 이상반응(18,008건, 97.1%)**이며, 중대한 이상반응 신고는 540건(2.9%) 신고되었습니다. ('22.3.31, 기준)
  - 중대한 이상반응: 아나필락시스 의심은 125건(합중 10만 건당 2.1건), 중환자실 입원 등 주요 이상반응 신고는 409건(합중 10만 건당 6.9건), 해당 연령에서 사망 신고 사례는 6건(합중 10만 건당 0.1건)이었습니다.
- 미국에서도 mRNA 백신 접종 후 심근염/심낭염 발생 보고가 있으며, 특히 12~15세에서 mRNA 백신 2차 접종 후 수일 이내 주로 발생하지만 대부분 경증으로 회복되는 것으로 알려져 있습니다.

Q6 코로나19 예방접종 전·후 주의사항은 무엇인가요?

접종 전	접종 후
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 건강상태가 좋을 때, 접종하기</li> <li>▶ 다음과 같은 경우 예방접종 연기하기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19 감염이 의심되는 경우</li> <li>- 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자</li> <li>- 발열(37.5°C 이상) 등 급성병증이 있는 경우</li> <li>- 1차 mRNA 코로나19 백신(화이자) 접종 후 심근염/심낭염 발생이 확인된 경우</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머무르며 이상반응 발생여부 관찰하기</li> <li>▶ 귀가 후 3시간 이상 주의 깊게 관찰하고 일주일 정도는 고강도의 운동 및 활동 자제하기</li> <li>▶ 접종부위 청결하게 유지하기</li> <li>▶ 평소와 다른 신체 증상이 나타나는 경우 의사의 진료 받기</li> </ul>

⚠️ 단! 다음과 같은 경우 코로나19 예방접종을 받아서는 안됩니다!

- ▶ 코로나19 백신 구성 성분에 대한 아나필락시스\*와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우
- ▶ 1차 코로나19 예방접종 후 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우, 첫 번째 백신과 동일 플랫폼의 백신으로 접종 금지
  - 아나필락시스 : 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종, 땀 전체의 발진, 빠른 심장 박동, 현기증, 쇼크 등의 증상등 동반한 심각한 알레르기 반응

★ 약(은 세척제 등), 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 등에 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 기록해 주세요 ★

3/4


질병관리청
2022.04.07

**Q7 코로나19 예방접종 후 발생 가능한 이상반응은 무엇인가요?**

- 예방접종 후 접종부위 통증이나 부기, 발적, 발열, 피로감, 두통, 근육통, 오한, 메스꺼움 등이 나타날 수 있음.
- 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종 등을 동반한 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타날 수 있음.
- mRNA 백신(화이자, 모더나) 접종 후 가슴 통증, 압박감, 불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 증상이 나타나는 심근염·심낭염이 발생할 수 있음.

**Q8 코로나19 예방접종 후 이상반응이 나타나면 어떻게 해야 하나요?**


- 접종부위 부기, 통증이 있는 경우 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질 하기
- 미열이 있는 경우, 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하기
- 발열이나 근육통 등으로 불편함이 있는 경우 해열진통제를 복용하기  
 \* 예방접종 전 아세트아미노펜 성분의 해열진통제 준비, 예방접종 후 증상 증상이 나타날 경우 해열진통제 복용
- 다음과 같은 경우에는 의사의 진료를 받으세요.
  - 가슴통증, 압박감, 불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우
  - 접종부위의 통증, 부기, 발적이나 발열 등이 **접종 후 2일이 지나도 호전되지 않거나 악화되는 경우**
  - 접종 후 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타나는 경우
- 다음과 같은 경우에는 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하세요.
  - 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우, 입술·얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우



이상반응 발생이 의심될 경우 1339 또는 관할 보건소에 문의하시기 바라며, 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr) 내 '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대처법을 확인할 수 있습니다.

4/4

**붙임 17 청소년 심근염·심낭염 진료 안내문(의료인용)**



- (A) 의료진 판단하여 퇴원:  
 (증상이 사라질 때까지 고강도 운동 / 경쟁적인 스포츠를 피하십시오)  
 - 정상 소견(정상 검사, 정상 검사)  
 - 저위험 심낭염(통증 및 심낭염 ECG는 변경되지만 활력 징후는 정상, 명확한 삼출 없음).  
 심근염이 있으면 NSAIDS를 시작하십시오. 심장 검진 / 외래 환자 심초음파 검사(사례별) 고려
- (B) 24시간 내에 반복 평가(ECG 및 트로포닌)를 통한 조기 추적  
 - 가능한 심근염(비특이적 ECG 변화, CRP/ESR 상승, 정상 트로포닌).
- (C) 다음과 같은 경우 심장(혹은 소아심장) 전문가의 자문을 구하십시오.  
 - 고위험 심낭염(통증 + 심낭염 ECG 변화 및 발열 또는 비정상적인 활력 징후 또는 명확한 삼출)  
 - 심근염(부정맥, 전도 지연, 비정상적인 활력 징후 또는 상승된 트로포닌).
- (D) 초기 검사에서 정상이어도 증상이 수일 이상 지속되는 경우 반복 검사가 필요할 수 있습니다.  
 \* 이상 소견이 있는 경우 보건 당국에 보고  
 \* 임상증상이 mRNA 백신의 첫 번째 접종과 관련된 경우 COVID-19 예방 접종에 대한 향후 권장 사항에 대해 전문가의 임상 조언을 구하십시오.

