

구분	번식	먹이활동
봄 (3~5월)	(2월말~4월) 독립기 1년생 수컷이 독립하는 시기로 분산·이동	(2월말~4월초) 지렁이, 유충 등 먹이를 찾아 농경지 인근에도 출몰, 이후 산에서 먹이 활동이 쉬워지면 다시 산으로 이동(4월~)
	(3월말~5월) 출산기 보금자리(둥지) 인근에서 생활	(4월말~8월) 산에서 주로 생활
여름 (6월~8월)	(5월~8월) 자돈 양육기 암컷의 경우 생활 반경이 보금자리 주변으로 제한됨	
가을 (9월~11월)	(9월~11월) 자돈 육성기 생활 반경이 넓어짐	(9월~11월) 수확기 농경지 인근에 자주 출몰 * 감자, 고구마 등 농작물 섭취
겨울 (12~2월)	(11월말~1월) 번식기(짝짓기) 2년 이상 수컷은 가임 암컷을 찾아 행동반경이 넓어짐	(12월~2월초) 산에서 생활하나, 폭설 등으로 먹이를 구할 수 없는 경우 농가 인근에 출몰하기도 함

□ 야생멧돼지 생태 특성

- (수명) 8~10년, 사육상 최대 20년
- (임신기간) 약 4개월
- (행동반경) 2~5km (환경부 SOP는 5km² : 반경 1.3km, 국립생물자원관)
- (짝짓기) 보통 1년에 1회, 11~1월(11~12월이 절정 시기)
 - ※ 봄 출산에 실패하거나 출산한 새끼를 잃은 경우 등에는 교미기가 아닌 시기에 재발정하여 가을경 출산하는 경우도 있음
- (임신·출산) 임신기간은 약 120일, 3~5월경 평균 4~5마리 출산(4~10마리)
 - ※ 모돈은 분만 한 달 전부터 서식범위가 감소
- (가족생활) 암컷(어미 1마리 또는 2~3마리와 새끼들) 중심의 가족단위로 생활, 어느 정도 자란 수컷(아성체, 생후 10개월~)은 출산 전(2~3월) 독립시킴 수컷은 새끼를 돌보지 않고 짝짓기 후 다시 단독으로 생활함
- (계절적 특성) 지방층이 두껍고, 열에 약한 동물로서 여름에 열을 식히거나 기생충 제거를 위해 진흙 목욕을 함, 겨울철에도 진흙 목욕을 하기도 함
- (먹이) 식물성 먹이(도토리, 식물의 뿌리 등)가 90%, 무척추(지렁이 등)·척추(설치류, 뱀 등)동물이 10%
- (생활환경) 깊은 산, 활엽수가 우거진 숲, 양지바른 곳에 땅을 파고 앞이 트인 곳을 선호함
 - 보통 ①먹이가 풍부하고 ②우거진 숲에 군집밀도가 높고, 근처에 ③이용 가능한 경작지가 있을 경우 등 숲과 경작지 사이를 선호
 - 새끼를 기르는 보금자리는 항상 물에서 최대한 가까운 곳에 위치
- (활동시기) 멧돼지는 본래 주간에 활동, 인간을 피해 초저녁이나 새벽의 어스름한 시기 또는 야간에 활동하는 경향도 보이게 됨
 - 멧돼지는 땀샘이 결여되어 체온유지를 위해 겨울과 봄에는 이른 아침과 늦은 오후에 활동이 높으며, 하절기에는 야행성 행동이 증가
- (이동속도) 3.5~5km/h 정도이나, 개방된 지역에서는 최대 시속 40~50km/h까지 낼 수 있으며, 1m 이상의 장벽을 뛰어넘을 수 있음
 - ※ 환경부 SOP는 2~15km/일